중재집 제6호를 내면서

혈관 및 중재적방사선과학 증례집

< 특집 : Embolotherapy >

제 6 호 · 1999년

혈관 및 중재적방사선과학연구회
대한방사선의학회

"Supported by grant from the BRACCO International Award 1999"

목 차

특 집 : Embolotherapy

Embolization of the Arteriovenous Malformations	<성균관의대>	도 영 수	1
Embolization of the Bronchial Artery	<연세의대 원주기독병원>	김 영 주	6
Embolization of the GI Bleeding	<동아의대>	박 병 호	11
Embolization of the Portal Vein	<울산의대>	성 규 보	19
Embolization of the Renal Artery	<경희의대>	오 주 형	24
Embolization of the Uterine Artery	<중문의대 분당차병원>	안 창 수	28

1. Embolotherapy

Case 1. Osler-Weber-Rendu증후군에서 폐동정맥류의 색전술	35
Case 2. Rasmussen동맥류의 색전술	38
Case 3. 코일을 이용한 폐동정맥기형의 치료	40
Case 4. Microcoil을 이용한 다발성 폐동정맥기형의 색전치료	42
Case 5. Embolization of Common Hepatic Artery Aneurysm	45
Case 6. 신생아의 선천성 간내 Portosystemic shunt : 제대 정맥을 통한 Coil 색전술	47
Case 7. 동맥담도루에 의한 혈액담즙증환자의 미세코일과 젤폼을 사용한 색전술	50
Case 8. 경피경간 담배액술 및 스텐트 삽입술 후 발생한 가성 동맥류의 색전술	52
Case 9. 만성췌장염에 의한 가성비장동맥류의 색전술	54
Case 10. 췌장염 환자에서 발생한 위십이지장동맥 가성동맥류의 코일을 이용한 색전술	56
Case 11. 혈관이형성증(Angiodysplasia)으로 인한 장출혈의 색전술	58
Case 12. 베체트씨 증후군 환자의 총간 동맥에 생긴 가성 동맥류의 색전술	60
Case 13. 신세포암에서 Embol과 코일을 이용한 신동맥 색전술	62
Case 14. 신장 동정맥기형의 색전술	64
Case 15. Guglielmi Detachable Coil를 이용한 파열 신동맥류 색전술	66
Case 16. 경피적 신장 생검 후 합병된 동정맥류의 코일색전술	68
Case 17. 에탄올을 이용한 신장의 동정맥기형의 치료	70
Case 18. 동맥류를 동반한 신장 동정맥 기형의 색전술	72
Case 19. 재발성 정계정맥류의 미세코일을 사용한 색전술	74
Case 20. 난소정맥류에 의한 골반통증증후군 : 난소정맥 색전술에 의한 치료	76
Case 21. 방광암의 경요도절제술 후에 발생한 지속적 혈뇨에 대한 선택적 동맥색전술	78
Case 22. 이상자궁출혈에서의 경동맥색전술	80
Case 23. 고속도 음경 강직증의 경동맥 색전술	82

Case 24. 정맥기형의 경피적 에탄올 색전술	84
Case 25. 대퇴동정맥류의 코일 색전술	86
2. Angioplasty	
Case 26. 내경동맥 협착의 Wallstent 설치술	88
Case 27. 하행 대동맥을 침범한 Takayasu's arteritis에서 스텐트 설치술	90
Case 28. 복부 대동맥과 신동맥을 침범한 Takayasu 동맥염의 풍선혈관 성형술 및 스텐트 설치술	92
Case 29. 풍선 혈관 성형술을 이용한 가성 동맥류의 치료	94
Case 30. 간이식 이후에 생긴 간정맥-하대정맥 문합부 협착에 대한 풍선 확장술	96
Case 31. 간이식 후 발생한 문맥 협착과 비장동맥의 가성동맥류: 스텐트와 코일을 이용한 치료	98
Case 32. 간이식후 간동맥 접합부위 협착에서의 혈관성형술	100
Case 33. Abdominal angina : 풍선혈관확장술로 치료	102
3. Thrombolysis	
Case 34. 상장간막동맥에서 발생한 동맥박리	104
Case 35. 하지의 심부 정맥 혈전증에서 카테터를 이용한 혈전 용해술과 스텐트 설치	106
Case 36. 장골대퇴정맥 혈전증과 정맥돌기 : 유로키나제 혈전용해와 풍선확장 및 혈관 스텐트를 이용한 병행치료	108
Case 37. 하지혈관의 급성색전에 대한 흡인 색전제거술과 Urokinase를 이용한 색전용해술	110
Case 38. Aortobifemoral bypass graft를 시행한 환자에서 발생한 폐색에 대한 Forgarty catheter를 이용한 혈전제거술과 Iliac stent 삽입	113
Case 39. 상장간막동맥 색전증 : Urokinase를 사용한 국소적 용해술	115
Case 40. 원발성 액와-쇄골하정맥 혈전증의 재소통술	117
Case 41. 좌측 장골 대퇴 정맥 혈전증 환자에서의 카테터를 이용한 혈전용해술과 스텐트 설치술	119
4. Stent-Graft	
Case 42. 베체트 병에 동반된 우쇄골하 동맥의 가성 동맥류에서의 Stent-graft 설치술	122
Case 43. 외장골동맥의 파열에 의한 대량 질출혈에 대한 스텐트 그래프트 삽입술	124
5. Others	
Case 44. 요추 디스크 수술 후 발생한 우측 총장골 동맥-하대 정맥 동정맥류 : 스텐트그래프트 설치를 이용한 치료	126
Case 45. Portal vein thrombosis와 동반된 Variceal esophageal bleeding치료를 위한 TIPS	128
Case 46. 거대 자궁근종에 의한 심부정맥혈전증 : 수술전 예방적 하대정맥 필터 설치술	130
Case 47. 카테터 꼬임의 해결 방법	133

Embolization of the Arteriovenous Malformations

도 영 수

성균관의대 삼성서울병원 방사선과학교실

Introduction

Congenital vascular malformations(CVMs) constitute some of the most difficult diagnostic and therapeutic enigma that can be encountered in the practice of medicine. The clinical presentations are extremely protean and can range from an asymptomatic birthmark to fulminant life-threatening congestive heart failure.

CVMs were first treated by surgeons. Complete extirpation of an CVM proved very difficult and extremely hazardous necessitating suboptimal partial resections. Partial resection could cause an initial good clinical response, but with time the patient's presenting symptoms recurred or worsened at follow-up. As catheter delivery systems and embolic agents improved, embolotherapy has emerged as primary mode of therapy in the management of CVMs.

Embryology of Congenital Vascular Malformations(Fig. 1)

A. Interlacing blood spaces in the primitive mesenchyme differentiate into a primitive capillary network(stage 1)

B. Primitive capillary coalesce into large plexiform structures(stage 2)

C. Disappearance of primitive elements and the appearance of mature vascular stems and capillary beds(stage 3)

D. Focal failure of the developmental sequence with the persistence of primitive vascular structures, resulting in a CVM.

Most pediatric hemangiomas are not present at birth, clinically manifest within the first month of life, and

Classification of Hemangiomas and CVM

Hemangioma	Congenital Vascular Malformation
Neoplasm	congenital anomaly
30% present at birth; remainder present in first 3 mo. Proliferative phase:	90% present at birth, although may not manifest
1st year	
Female: male ratio of 5:1	Female:male ratio of 1:1
Endothelial proliferation	No cellular proliferation
Growth in tissue culture	No growth in tissue culture
Cellular stroma	No mast cells
Increased mast cell	No spontaneous involution
	grow with individual
Spontaneous involution in 95% by age 7	May or may not require treatment
No treatment required in vast majority	

(Mulliken, 1982)

exhibit a rapid growth phase in the first month of life, and exhibit a rapid growth phase in the first year. More than 90% of pediatric hemangiomas spontaneously regress to near complete resolution by five to seven years of age.

CVMs are vascular lesions that are present at birth and grow commensurately with the child. Trauma, surgery, hormonal influences caused by birth control pills, and hormonal swings during puberty and pregnancy may cause the lesion to expand hemodynamically.

CVMs can be classified as high-flow (arteriovenous malformations;AVM and arteriovenous fistulae;AVF) and low flow (venous malformations;VM, lymphatic malformations;LM, and mixed lesions) malformations.

Initial Evaluation

A. Venography

Venography may be required in VM. This allows visualization of the abnormal venous vascular elements

Fig. 1

filled by retrograde venous injection, which may be opacified incompletely with angiography alone.

B. Angiography

Baseline angiography is used for planing treatment and comparison with follow-up studies to determine the efficacy of therapy of AVM and AVF.

C. Color Doppler Imaging(CDI)

CDI is an essential tool in the diagnostic workup of AVM and AVF. Accurate measurements of flow volumes and resistive indexes can be helpful in the initial evaluation and also are important noninvasive parameters for follow-up after therapy. High-flow CVMs are characterized as enlarged in-flow arteries and dilated draining veins. Spectral analysis of the in-flow arterial feeders demonstrates low S/D ratio, resistive index.

D. MRI

MRI has replaced CT in the evaluation of CVMs. MR easily distinguishes between high-flow CVMs and low-flow CVMs, and the relationship to adjacent anatomic structures, such as muscles, nerves, and organs, is easily determined. High-flow lesions demonstrate a signal

void on most sequences and enlarged feeding arteries and draining veins. Low-flow CVMs have a characteristic signal intensity that is greater than skeletal muscle on both T1- and T2-weighted images, but is less than subcutaneous fat on T1 images and greater than fat on T2 images. At follow-up, MR can accurately determine residual areas of CVMs as well as those areas that have been treated.

E. Whole Blood Pool Scintigraphy

Whole blood pool scintigraphy with ^{99m}Tc -RBC is an essential tool in diagnostic workup of VM, AVM, and AVF. CVMs except lymphatic malformation are always demonstrated as hot uptake lesions at whole blood pool scintigraphy. Accurate measurements of uptake in the lesion are helpful in the initial evaluation and also are important noninvasive and cheap tools for follow-up after therapy.

Indications of Treatment

Absolute indications : hemorrhage, secondary is-

Fig. 1

filled by retrograde venous injection, which may be opacified incompletely with angiography alone.

B. Angiography

Baseline angiography is used for planing treatment and comparison with follow-up studies to determine the efficacy of therapy of AVM and AVF.

C. Color Doppler Imaging(CDI)

CDI is an essential tool in the diagnostic workup of AVM and AVF. Accurate measurements of flow volumes and resistive indexes can be helpful in the initial evaluation and also are important noninvasive parameters for follow-up after therapy. High-flow CVMs are characterized as enlarged in-flow arteries and dilated draining veins. Spectral analysis of the in-flow arterial feeders demonstrates low S/D ratio, resistive index.

D. MRI

MRI has replaced CT in the evaluation of CVMs. MR easily distinguishes between high-flow CVMs and low-flow CVMs, and the relationship to adjacent anatomic structures, such as muscles, nerves, and organs, is easily determined. High-flow lesions demonstrate a signal

void on most sequences and enlarged feeding arteries and draining veins. Low-flow CVMs have a characteristic signal intensity that is greater than skeletal muscle on both T1- and T2-weighted images, but is less than subcutaneous fat on T1 images and greater than fat on T2 images. At follow-up, MR can accurately determine residual areas of CVMs as well as those areas that have been treated.

E. Whole Blood Pool Scintigraphy

Whole blood pool scintigraphy with ^{99m}Tc -RBC is an essential tool in diagnostic workup of VM, AVM, and AVF. CVMs except lymphatic malformation are always demonstrated as hot uptake lesions at whole blood pool scintigraphy. Accurate measurements of uptake in the lesion are helpful in the initial evaluation and also are important noninvasive and cheap tools for follow-up after therapy.

Indications of Treatment

Absolute indications : hemorrhage, secondary is-

chemic complications, and congestive heart failure from arteriovenous shunting.

Relative Indications : pain, functional impairment, and cosmetic deformity, including limb asymmetry associated with extremity lesions.

Ethanol Embolotherapy

A. Ethanol

Ethanol induce thrombosis by denaturing blood proteins, dehydrating vascular endothelial cells and precipitating their protoplasm, denuding the vascular wall totally of endothelial cells, and segmentally fracturing the vascular wall to the level of the internal elastic lamina. The combination of all these factors causes an acute thrombosis.

Alcohol embolotherapy of large complex vascular malformations should be staged for several reasons. First, a single embolization procedure may require sev-

eral hours in itself, and contrast limits can be exceeded in a lengthy procedure. Moreover, serial embolotherapy reduces the risk of too extensive embolization, thereby decreasing the risk of tissue necrosis, lesion rupture, or potential complications of post-thrombosis edema.

The maximum volume of ethanol used in treating patients with CVMs rarely exceeds 0.5–1.0 ml/kg body weight. Total dose exceeding these doses can lead to ethanol toxicity.

B. Anesthesia

With the use of intravascular ethanol, pain control is a significant problem. Anesthesiologists can aid in solving this problem and determine whether general anesthesia or intravenous sedation is required for the procedure.

In patients with large AVM and AVF, as opposed to small lesions and VM, Swan-Ganz and arterial line monitoring should be performed. Pulmonary artery pres-

Fig. 2. 32 year old female with foot ulcer due to infiltrative arteriovenous malformations.

A,B. Angiogram shows dilated feeding arteries and infiltrative arteriovenous malformations (arrows) with early dilated draining veins (arrow heads) at left foot. Note multiple small intravascular coils which were inserted at other hospital.

C,D. Follow-up angiogram after several sessions of ethanol embolotherapy by intra-arterial approach or direct puncture of arteriovenous malformations shows markedly reduced arteriovenous malformations.

pressures are consistently monitored during the injection of absolute ethanol. Ethanol reaching the pulmonary artery through AVM nidus or AVF may cause precapillary spasm, pulmonary arterial hypertension, and then cardiopulmonary collapse. Once pulmonary artery pressures begin to rise, it is best to wait and not inject any more ethanol until the pulmonary pressures begin to normalize. If pulmonary artery pressures become pathologically high, the infusion of nitroglycerin, or prostaglandin E1 through the Swan-Ganz line can lower the intrapulmonary pressures.

C. Arteriovenous Malformations(AVM) (Fig. 2)

Detailed arteriography is performed to determine the angioarchitecture of the AVM. In treating AVMs, superselective catheter placement is absolutely essential. If the patients have had prior therapy(surgical ligation, partial resection, intraarterial coil placement, tissue adhesives embolization) or superselection is not possible, direct puncture techniques should be used.

Inflow occlusion using balloon catheter, blood pressure cuff, tourniquet is not always required to induce vascular stasis to maximize the thrombogenic properties of ethanol. Inflow occlusion can reduce the total amount of ethanol, but increase the risk of complications such as tissue necrosis or proximal embolization.

Multi-directional arteriograms must be performed to determine exactly the flow characteristics of the AVM and anatomy of normal vascular structure so that an appropriate volume and rate of ethanol injection may be determined.

After ethanol injection, wait for 10-15 min, then arteriograms should be performed to determine if therapy is complete or further embolization is required. The amount of ethanol used in each procedure is tailored to the flow-volume characteristics of the individual lesion.

After the procedure and recovery from anesthesia, patients are sent to the ICU. Postoperative management consists of steroid, anti-acid medication, fluids, and pain control.

D. Venous Malformations(Fig. 3)

Direct-puncture angiogram is performed to assess the adequacy of position for ethanol injection. Ethanol embolotherapy is directed against the abnormal venous malformed elements. If venous occlusion is desirable to prevent unwanted outflow of ethanol into normal venous structures, extrinsic tourniquets, pneumatic blood pressure cuffs, and manual digital compression can be utilized. The amount of ethanol used is equal to the flow-volume characteristics of the venous malfor-

Fig. 3. 10 years old female with pain due to venous malformations at left calf area.
A. MRI of T2-WI with fat suppression shows intramuscular venous malformations at calf area as high signal intensity lesions.
B. Five sessions of ethanol embolotherapy were performed by direct puncture of venous malformations (arrows).
C. Follow-up MRI shows reduced volume of venous malformations. But further several sessions of ethanol embolotherapy are necessary to treat residual lesions.

mation compartment. Not all patients requires total obliteration of their malformation to achieve a symptomatic improvement.

E. A-V Fistulae(AVF)

Congenital and post-traumatic AVF are similar to AVMs in that they are high-flow vascular malformations. AVF is characterized by an artery connected to a draining vein without an intervening capillary bed.

The natural history of AVF can be extremely varied. AVF can remain clinically silent. If the shunt through an AVF is large, hemodynamic consequences such as cardiomegaly, increased cardiac output, and intermittent bouts of congestive heart failure can occur. Vascular steal alone may cause ischemic symptoms in the tissues or organs to the AVF as well.

Treatment of AVF requires complete occlusion of the AV connection. Surgical ligation are not only futile, they remove possible vascular access routes for endovascular ablative therapy. Various vascular occlusive devices, such as spring coil, detachable balloons, PVA, and tissue adhesives(IBCA) have been successful in occluding AVF. Recanalization and recurrences have been reported with the use of IBCA, and detachable balloons. Ethanol has proven extremely successful in closing renal AVF, and recurrent peripheral and neural axis AVF.

F. Follow-up

All patients exhibited focal swelling in the area of treated procedure. Most patients had the majority of the swelling resolved by 2 weeks. In those patients with toe, foot/ankle, and/or leg malformations, the time until the swelling resolved could last up to 3 weeks.

After serial therapy, MR, Whole blood-pool scintigraphy, and/or CDI are used to document the efficacy of the therapy. CDI spectral analysis gives accurate information in treated and untreated AVM and AVF.

Complications

In patients with CVMs, complication rates greater than 10% must be expected. Complication rates are related to the tissue that are being embolized. Nontarget embolization with ethanol will lead to tissue necrosis, as capillary beds of normal arteries will be totally destroyed. Therefore, it is essential that superselective

catheter positioning be achieved before ethanol can be used.

Venous thrombosis, skin blister, injury to adjacent muscle or other tissue is possible. Motor or sensory nerve injuries may occur as well by the swelling. Bleeding is an uncommon complication. Hematuria by the intravascular hemolysis effect of ethanol is observed more than 10% of patients. It resolved spontaneously without any problem.

Conclusions

When it is clear that CVMs must be treated, then embolotherapy should be employed first, whether or not surgery is contemplated. In unresectable CVMs, embolotherapy is the only therapeutic alternative.

Alcohol is superior to many embolic agents because it is easy to use and induces an intense thrombosis to the level of the smallest-caliber vessels. To optimally manage these patients, a dedicated team(interventional radiologist, surgeon, anesthesiologist) should be in place.

References

1. Behnia R. Systemic effects of absolute alcohol embolization in a patient with a congenital arteriovenous malformation of the lower extremity. *Anesth Analg* 1995;80:415-417
2. Yakes WF, Parker SH, Gibson MD, Haas DK, Pevsner P, Carter TE. Alcohol embolotherapy of vascular malformations. *Semin in Intervent Radiol* 1989;6(3) : 146-161
3. Yakes WF, Haas DK, Parker SH, et al. symptomatic vascular malformations: ethanol embolotherapy. *Radiology* 1989;170: 1059-1066
4. Yakes WF, Luethke JM, Merland JJ, et al. Ethanol embolization of arteriovenous fistulas: a primary mode of therapy. *JVIR* 1990;1:89-96
5. Finn MC, Glowacki J, Mulliken JB. Congenital vascular lesions : clinical application of a new classification. *J Pediatr Surg* 1983;18:894-900
6. Yakes WF. Extremity venous malformations: diagnosis and management. *Semin in Intervent Radiol* 1994;11(4):332-339
7. Yakes WF, Rossi P, Odink H. How I do it : Arteriovenous malformation management. *Cardiovasc Intervent Radiol* 1996;19: 65-71
8. Rak KM, Yakes WF, Ray RL, et al. MR imaging of symptomatic peripheral vascular malformations. *AJR* 1986;159:107-112
9. Doppman JL, pevsner P. Embolization of arteriovenous malformations by direct oercutaneous puncture. *AJR* 1983; 140:773-778

Embolization of the Bronchial Artery

김 영 주

연세대학교 원주의대 진단방사선과학교실

서 론

객혈의 치료방법으로는 지혈제 투여, 안정, 폐배액법 및 기관지경을 이용한 내과적 처치나 폐절제술 및 폐엽절제술 같은 외과적인 치료가 있으며 중재적 방사선학적 시술방법인 동맥 색전술이 있다.

객혈은 소량인 경우는 대부분 멈추지만 대량객혈은 24시간 내에 300ml 이상 출혈로 정의되며, 한번 객혈시 약 150ml 이상 기관지내에 객혈이 있을 때는 질식에 의해 사망할 수 있고(1) 출혈 자체로도 사망할 수 있으며 내과적인 치료만으로는 사망률이 80%에 육박하고 수술자체의 사망률도 20-30% 정도로 높으며 폐기능장애나 미만성질환은 수술이 어렵고 지혈도 힘들어서 동맥색전술이 1974년 Remy 등에 의해 처음소개가 되었다(2).

동맥색전술은 객혈이 있을때 즉각적인 지혈효과를 얻을 수 있으며 수술전에 환자상태를 호전시켜 수술사망률을 9% 정도로 낮출 수 있으며 만성폐질환이나 폐기능장애에 의해 수술이 불가능한 경우에도 매우 유효한 치료방법이다.

기관지동맥의 해부학

기관지동맥은 제3흉추부터 제8흉추부위의 대동맥에서 기시하나 주로 제 5,6흉추 부근의 대동맥에서 직접 기시하며 주요한 동맥양상은 아래와 같으며 다양한 모양을 보인다(3-5).

- I. Two arteries on the left and one right as common trunk with intercostal suprema (40.6%)
- II. One artery trunk on the left and one on the right (21.3%)
- III. Two arteries on the left and two on the right (20.7%)
- IV. One artery on the left and two on the right

Cohen과 Mccherson의 발표에 의하면 Aberrant bronchial artery가 35%에서 보이며(6) 갑상경동맥간(Thyrocervical trunk), 내유방동맥(Internal mammary artery), 늑막동맥간(Intercostal trunk)와 늑간동맥(Lower intercostal artery)에서 기시한다고 하였다(Fig. 1). 폐결핵

Fig. 1. A. Enlarged tortuous left bronchial artery is seen with high flow, peribronchial hypervascularity and diffuse peribronchial staining in patient with bronchiectasis.

B. Same findings are seen in left internal mammary arteriogram.

이나 국균증 같은 만성폐질환이 늑막을 침범시에는 늑막동맥, 쇄골하동맥이나 액와동맥 분지에서 Transpleural Collateral 이 형성되므로 주의가 필요하다(Fig. 2).

기관지동맥색전술시 가장 주의해야 할 혈관은 전척추동맥(Anterior spinal artery)인데 이것은 주로 늑간동맥에서 기시하나, 5%는 우측늑간기관지 근간(Inter-costobronchial trunk)이나 우측 기관지동맥에서 기시하며 제 4흉추와 7흉추 사이의 1-2개의 척수동맥(medullary artery)이 연결되어 있고 측부순환이 적어서 주의를 요하며, 드물게는 Bronchial-to-coronary artery communication이 있을 수 있어서 혈관 조영술 소견을 주의 깊게 살펴보아야 한다(7).

동맥색전술의 개요

기관지동맥색전술시 사용하는 도관은 7F Femoral-renal A-1 Catheter(Cordis), 6.5F Bronchial catheter (Clini-

cal), Simmons catheter, 7F HIH catheter, 4F나 5F Cobra Catheter등을 사용할 수 있고, 심한 폐질환에 의한 종격동전이나 대동맥의 만곡이 있어 쇄골하동맥의 조영이 불가능할 때는 상완동맥을 이용하여 선택적 조영을 하기 위한 5.2F RCI catheter(Cordis)등을 사용할 수 있으며 중요한 점은 동맥에 깊숙이 밀어 넣어 색전술을 시행해야 하며, Microcatheter를 이용하면 용이하게 시행할 수 있다(Fig. 3).

색전물은 Gelfoam particle이나 Ivalon이 많이 사용되며 이 색전물들을 저삼투성 조영제와 혼합하여 대동맥으로 역류가 발생되지 않도록 조심하며, 너무 작은 크기의 색전물을 사용할 때는 식도나 기관지동맥을 막거나 척추동맥을 막아서 합병증을 일으킬 수 있고 IBCA(isobutyl-2 cyanoarylate)나 Ethanol의 사용도 보고되어 있으나 실제로는 거의 사용되지 않는다.

색전을 시행할 때 기관지동맥의 체측부동맥으로는 늑간 동

Fig. 2. A. Right intercostal arteriogram shows hypertrophied artery and hypervascularity in tuberculous lesion and direct communication with pulmonary vessel.
B. Right intercostal supra-arteriogram reveals bronchopulmonary shunt formation.
C. Left subclavian arteriogram shows numerous collaterals and hypervascularity in left upper lung field in a patient with tuberculosis with pleural infiltration. Left main pulmonary artery is seen through transpleural anastomosis.
D. Left axillary arteriogram shows similar findings in another patient with pulmonary TBC.

맥(Intersoctal artery), 내유방동맥(Internal mammary artery), 측흉동맥(Lateral thoracic artery), 흉경봉동맥(Thoracoacromial artery), 액와동맥(Axillary artery)등 쇄골하동맥분지 전부를 포함할 수 있고 드물게는 늑경동맥간(costocervical trunk), 갑상경동맥간(thyrocervical trunk) 등이 있으므로 동맥색전술을 시행할 때 만약 폐질환이 폐침부나 흉막까지 파급되어 있을때는 쇄골하동맥조영술, 폐기저부가 포함되어있을때는 하횡격(Inferior phrenic) 동맥조영술이 필요하다(8,9).

객혈치료 목적으로 동맥조영술을 시행할 때는 하나의 혈관이 원인이 되는 경우도 있지만 여러 혈관이 원인이 되는 경우도 자주 발생되므로 모든 혈관을 다 찾는다는 생각으로 충분한 시간에 여유있게 시행해야 한다(Fig. 4).

객혈의 원인

객혈의 원인으로는 폐결핵, 기관지확장증, 국균증, 폐암(Fig. 5)등이 주원인이며 그외에 기관지흉막누공, Sarcoidosis, 만성폐염, 폐낭종, 만성기관지염등 다양하며, 우리나라에서는 폐결핵 등에 의한 만성염증성질환이 주원인이며 폐결핵에 의해 기관지주위의 염증성조직내에 기관지동맥-폐동맥문합이 생기며 기관지동맥압이 증가되어 혈관확장이나, 기관지동맥의 파열, 혈관의 만성적 삼출, 폐결핵 공동 주위폐동맥의 미란 혹은 동정맥류의 파열로 인해 객혈이 발생된다(Fig. 6).

폐결핵치료이후에는 잔류공동내의 미생물집락, 반흔내의 종양발생, 출혈성질환의 합병 등이 원인이 되며, 그외에 기관지확장증, 폐결핵재발, 만성기관지염, 국균증등이 원인이 된다.

기관지 확장증의 경우는 기관지동맥이 비대해지고 폐동맥과의 문합이 증가되어 저산소증에 의한 혈관수축으로 모세혈

관파괴, 문합의 개방에 의한 혈류량의 증가등이 객혈의 원인이 된다(10-13).

Rasmussen aneurysm은 결핵에 의한 동공에서 발생되며 폐동맥 원위부에서 발생하는 데 만약 동맥색전술이 실패했을 때 이 것이 객혈의 원인이 될 수 있다는 것을 염두해야 한다(14).

혈관조영술 소견

Rabkin등은 색전대상혈관의 조영술소견으로 직접소견은 조영제 일출과 기관지동맥분지의 혈전등, 간접소견으로는 과혈관신생, 기관지동맥 폐동맥간 단락, 조영제의 동맥주위 확산, 기관지동맥류형성을 보고하였으며 실제로는 조영제 일출은 매우 드물게 보이므로 여러 간접소견을 보아 색전술을 시행해야하며 양측 폐의 침윤이 심할 때는 기관지내시경이 객혈부위를 찾는데 많은 도움을 준다(5).

재출혈 원인

객혈의 원인되는 혈관 색전술후 재출혈의 원인은 불완전색전, 흡수성 색전물의 재개통, 원인질환의 진행, 국균증 및 측부순환등이 원인이며 폐암이나 폐농양의 경우는 국소적인 허혈이 중앙의 괴사를 일으켜 폐동맥의 미란을 일으켜 재출혈이 발생되며 폐결핵은 원래있던 병변이 진행되고 측부순환이 커지면 병변내에 혈관의 측부를 통한 재개통이 있어 재출혈률이 높다.

국균증은 두꺼운 공동벽내에 무수한 혈관분포가 있고 만성 공동성 질환에서 관찰되는 기관지동맥 폐동맥문합이 형성되고 균중에 의한 혈관벽 손상이 일어나 동맥색전술을 시행하더라도 재출혈률이 높으므로 응급처치후에 수술로 근본치료를

Fig. 3. A. The pattern of right bronchial artery is common trunk with intercostal supra and hypervascularity is seen from right bronchial artery.
B. Selective right bronchial arteriogram was done to save intercostal supra using microcatheter.

하는 것이 좋다(9,15).

동맥색전술의 효과

기관지동맥색전술시 초기 지혈성공률은 Uflaker등(9)이 77%, Remy 등(8)이 84%, Rabkin(5)등이 91%, Haya-kawa 등이 86%로 좋은 결과를 보고하였고, 국내의 보고들(10-13)도 비슷한 결과를 보이나, 장기추적을 시행했을 때 문헌고찰에 의하면 재출혈율이 외국의 경우 28-52%로 보고되어 있으며, 대부분의 재출혈은 소량으로 대증요법으로 치료가 된다.

국내의 장기치료 결과는 60% 전후이며 특히 폐결핵의 경우 장기추적결과가 낮으며 기관지동맥외체측부동맥으로 많은 혈관분포가 있을수록, 체측부동맥에서 폐동정맥으로의 단락소견(Fig. 2)이 많을수록 재출혈 가능성이 높다는 보고도 있다(10-13).

기관지 동맥색전술시 합병증

경미한 합병증은 5일내지 7일까지 지속되는 건통, 흉통과 고열이 있으며 심각한 합병증은 Novak은 846명중 2.7%에서 발생했다고 했으며, 우측 제5 늑간동맥을 폐쇄시킬 때 발생할 수 있는 Transverse myelitis와 spinal cord infarction, Bronchial wall ischemia에 의한 Lt. mainstem bronchial stenosis, Bronchoesophageal fistula 등을 보고하였으며 이러한 합병증을 막기 위해서는 적어도 325 μ m 크기이상의 색전물을 사용하고, 가능한 깊게 동맥을 선택하고 신경독성이 적은 저삼투압성 조영제를 사용해야 한다(16,17).

결 론

객혈치료에 있어서 동맥색전술은 초기지혈에 있어서 매우

Fig. 4. A,B. Right bronchial arteriogram shows hypervascularity in right upper lobe. Another right bronchial artery with intercostal suprema is visualized.
C,D. The arteriogram of common trunk bronchial artery shows hypervascularity with aneurysmal dilatation in left lower lung field in patient with bronchiectasis. However another left bronchial artery show much hypertrophied and peribronchial tissue staining in left lower lung.

Fig. 5. The common bronchial trunk shows hypervascular round mass like lesion in left lower lung field, which is proven as having small cell carcinoma.

효과적인 시술이며, 기관지동맥의 체측부동맥을 찾아내고 색전하는 것이 객혈의 성공적인 치료에 필수적이다. 그렇지만 동맥색전술의 장기적인 치료효과는 비교적 낮으므로 동맥색전술로 응급치료후 수술이 가능한 경우 근본원인을 제거하는 것이 좋으며 수술이 불가능한 경우는 여러 치료방법을 복합하여 적극적 치료가 필요할 것이다.

참 고 문 헌

1. Stoll JF, Bettmann MA. Bronchial artery embolization to control hemoptysis: a review. *Cardiovas Intervet Radiol* 1988;11:263-269
2. Remy J, Voisin C, Dupuis C, et al. Traitment des hemoptysis par embolization de la circulation systemique. *Ann Radio(Paris)* 1974;17:5-16
3. Uflacker R, Kaemmerer A, Picon PD, et al : Bronchial artery embolization in the management of hemoptysis : Technical aspects and long-term results. *Radiology* 1985;157:637-644
4. Cauldwell EW, Siekert RG, Linger RE, et al : The bronchial arteries. *Surg Gynecol Obstet* 1948;86:395-412
5. Rabkin JE, Astafiev VI, Gothman LN, et al : Transcatheter embolization in the management of pulmonary hemorrhage. *Radiology* 1987;163:361-365
6. Cohen AM, Doershuk CF, Stern RC. Bronchial artery embolization to control hemoptysis in cystic fibrosis. *Radiology* 1990;175:401-405

Fig. 6. Right bronchial arteriogram shows hypertrophied arteries and bronchopulmonary shunting.

7. Kardjiev V, Symeonov A, Chanko I: Etiology, pathogenesis and prevention of spinal cord lesions in selective angiography of bronchial and intercostal arterioes. *Radiology* 1974;112:81-83
8. Remy J, Arnaud A, Fardou H, et al : Treatment of hemoptysis by embolization of bronchial arteries. *Radiology* 1977;122:33-37
9. Uflacker R, Kaemmerer A, Nerves C, et al : Management of massive hemoptysis by bronchial artery embolization. *Radiology* 1983;146:672-632
10. 김성민, 김영주, 양학식등. 동맥색전술을 이용한 객혈의 치료 대한방사선의학회지 1994;30:1029-1034
11. 조관수, 김영주, 김성민등. 결핵에 의한 객혈의 동맥색전술 : 재출혈의 요인 대한방사선의학회지 1996;35:183-188
12. 김진철, 김용주, 강덕식등. 기관지동맥 색전술을 이용한 객혈의 치료 대한방사선의학회지 1988;24(2):187-195
13. 성영순, 서경진, 김용주. 기관지동맥 색전술의 임상적 고찰 대한방사선의학회지 1992;28(4):505-512
14. Kardir S. Current practice of interventional radiology. In:Remy J,ed. Embolization of the treatment of hemoptysis. Philadelphia,PA:BC Decker, Inc. 1991;194-202
15. Shapiro MJ, Albe;da SM, Mayock RL, et al. Severe hemoptysis associated with pulmonary aspergilloma. Percutaneous intracavitary treatment. *Chest* 1988;94:1225-1231
16. Castaneda-Zuniga WR. *Interventional Radiology*. Baltimore : Williams & Wilkins, 1997:63-67
17. Han MC, Park JH. *Interventional Radiology*. Seoul. Ilchokak , 1999:24-29

Embolization of the GI Bleeding

박 병 호

동아대학교 의과대학 진단방사선과학교실

Nusbaum 등이 하부위장관 출혈을 동맥내 거치한 카테터를 통하여 성공적으로 지혈한 이후, 위장관 출혈에 대한 경피적 색전술 혹은 약물 주입요법이 시행되고 있다. 현재 경피적 혈관 색전술은 아주 효과적인 혈관폐쇄 방법으로 알려져 있으며, 위장관의 출혈, 각종 혈관성병변 및 선천성 혈관기형 등의 치료목적으로 혈관 색전술이 널리 적용되고 있다.

모든 중재적 시술에 완벽한 100% 성공과 0%의 합병증은 있을 수 없지만, 가능한 성공률을 높이고, 합병증을 낮추어야만 임상 의사와 환자들의 신뢰를 얻을 수 있다. 성공적인 색전술을 위해 반드시 치료하고자 하는 부위의 해부학적인 구조를 알고 있어야 하며, 치료 적응증과 금기증 등에 대한 깊은 이해뿐 아니라 색전시 사용할 카테터와 색전물질의 선택, 색전할 부위의 정확한 선택등과 같은 술기에 관련된 사항을 잘 알고 있어야 성공적인 시술을 할 수 있다.

성공적인 색전술이라 할지라도 때로는 완전한 임상적인 성공(Clinical success)은 얻지 못하고 기술적인 성공(Technical success)으로 만족해야 할 때가 있고, 때로는 환자의 증세를 경감시켜주는 완화치료(palliative treatment)로 만족해야 할 때도 있다.

경피적 혈관 색전술은 1) 대량 출혈로 인한 사망을 방지하고, 2) 환자의 상태를 수술받기에 적당한 상태로 호전시키기 위해 실시하거나 3) 때에 따라 질환이 근본적인 치료목적으로 시행한다는 것을 잊지 않아야 한다.

위장관의 출혈로 인한 중재적 방사선 시술은 크게 두가지로 나눌 수 있다. 하나는 혈관수축제(vasoconstrictor drug)를 카테터를 통하여 주입함으로써 출혈을 멎게 하는 것이고, 다른 하나는 색전물질을 이용하여 출혈을 멈추게 하는 방법이다. vasopressin의 주입은 혈관을 수축시켜 지혈의 목적을 얻는다. 그러나 고혈압환자, 심근경색이 있거나 의심되는 환자, 죽상경화증이 있거나, 동맥류가 있는 환자 등에서 vasopressin의 투여는 많은 제약이 있거나 금기증이며, 장의 경색 등의 합병증도 색전술에 못지 않으며, 투여중 중환자실에서 관리가 필요하고, 최소한 24시간 카테터를 유지해야 하는 등 많은 제약이 있다. 또한 vasopressin을 최초 20-30분간 투여하고 시행한 혈관조영상에 지혈이 되지 않으면 색전술로써 지

혈을 해야한다. 그러므로 현재는 vasopressin의 투여없이 바로 색전술을 시행하는 경우가 많다.

색전술은 상부 위장관과 하부 위장관의 색전방법이 조금 차이가 있고, 색전 성공율도 다르므로 상부 위장관과 하부 위장관의 출혈로 나누어 이해하는 것이 좋다.

카테터의 선택과 출혈 소견의 확인

일반적으로 5F 크기의 cobra형 카테터가 일반적인 카테터로 가장 무난하나, 출혈부위의 위치와 혈관의 직경등을 고려하여 3F 굵기의 미세카테터(microferret®(Cook), tracker®(Target), S-P®(Terumo))등을 이용하여 coaxial approach 하는 것이 좋은 결과를 얻을 수 있다.

혈관조영술은 0.5cc/ml의 출혈만 있어도 진단이 가능한 것으로 되어 있다. 그러나, 총복강동맥이나 상장간동맥등의 기시부에 5F카테터의 끝을 위치한 다음 혈관 조영을 시행 할 경우에도 출혈이 있음에도 불구하고 출혈의 증거를 찾지 못하는 경우가 허다하다. 이는 출혈성 병변이 항상 출혈을 유지하고 있는 것이 아니라 출혈과 지혈을 반복하기 때문이며, 출혈이 많거나, 출혈이 장시간 지속된 경우 혈관의 생리적인 수축으로 인해, 혹은 내과적 약물의 작용등으로 인해 혈관 조영술 당시 모든 출혈이 혈관 조영술로 발견되지는 않는다. 상부 위장관 출혈의 약 20%에서 출혈 부위를 혈관 조영에서 찾을 수 없으며, 하부 위장관의 경우 약 40% 내외에서 출혈을 발견할 수 없다고 보고되어 있다. 그러므로 가능한 혈관 조영전에 어느 장기의 출혈이 있는지에 대해 정보를 갖고 있는 것이 중요하며, 가능한 출혈이 의심되는 부위의 혈관을 국소화하는 노력이 필요하다.

출혈 병변을 진단하지 못하면 색전치료는 접근할 수 없게 된다. 그러므로 출혈을 할 당시에 즉시 혈관 조영을 하는 것이 중요하며, 이용가능한 방사선동위원소를 이용한 출혈부위의 추적이나, 내시경적 소견, 환자의 병력, 토물, 혈변의 유무 등과 같은 이학적 검사가 출혈병변을 추정할 수 있는 단서가 되기도 한다. 때에 따라 출혈이 의심되는 혈관을 3F의 미세카테터로 초선택이 필요한 경우도 있다.

출혈하는 혈관을 선택하여 혈관 조영을 시행하면 조영제가 혈관의 밖으로 새는 것으로 출혈을 확인 할 수 있으며, 출혈이 많은 경우 조영제가 장의 연동운동과 함께 움직이는 것을 관찰 할 수 있고, 혈관의 일출(extravasation)된 조영제가 많을 경우 장의 점막이 관찰되기도 한다. 일출된 조영제가 장기의 점막주름을 따라 마치 정맥의 모양처럼 그려져 (pseudovein sign) 출혈부위를 착각하게 하는 경우도 있다. (Fig. 1) 또한 DSA를 이용하여 혈관 출혈을 확인하고자 할 때 장의 연동운동에 의한 인공음영(artifact)으로 인해 출혈 병변이 가려져 출혈병변을 놓칠 수 있기 때문에 반드시 Mask image와 비교하거나, subtraction을 제거한 뒤 serial view를 비교하는 것이 중요하다 (Fig. 2).

출혈 병변이 발견되지 않는 장 출혈의 경우 때로는 혈관 확

Fig. 1. Pseudovein sign. The gastric lumen is filled by blood clot. The extravasated contrast dye is filling along the gastric fold, which looks like venous filling of contrast dye. (by courtesy of professor YH Kim of Kyungbuk University, College of Medicine)

장제(prostaglandin, nitroglycerin, tolazoline), 항응고제(heparin), 항혈전제(urokinase) 등을 투여하여, 출혈 유발 시험으로 인위적인 출혈을 조장한 다음 출혈 부위, 혈관 등을 찾아서 지혈하기도 한다. 저자도 가끔 혈관 확장제인 prostaglandin E1(PGE1)으로 유발시험을 시행한다. PGE1은 아주 강력한 혈관 확장제이며, 항혈소판, 항소염작용을 갖는 약제이다. 하지만 역설적으로 이 약제는 adult respiratory distress syndrome을 막고 치료하는 약이기도 하다. PGE1을 사용하면 혈소판의 수 감소를 방지하고, 혈전형성을 촉진하여, 대량 수혈에 의한 응고장애를 막을 수 있다는 보고가 많기 때문이다. 비록 출혈 유발시험을 이용하여 출혈혈관을 찾은 보고들에서 위험한 정도의 합병증은 없었다고 보고하고 있지만 유발시험을 안전하게 시행하기 위해 병리검사, RI test, 약제의 복합적 사용 등이 전제되어야 하며, 금액적인 면도 무시할 수 없으므로 초보자는 사용하지 않는 것이 좋겠다.

저자의 경우 출혈이 확인 되지 않을 경우 상부위장관 출혈로 의심되는 환자는 left gastric artery를 일단 젤폼으로 색전하며, 상장간막 동맥의 분지의 출혈이 의심되는 경우 상장간막 동맥 조영을 먼저 시행하고, 5F Cobra 카테터를 상장간막 깊숙히 넣어 조금씩 카테터를 뒤로 뽑으며 순차적으로 가지혈관을 조영하는 방법을 취한다. 이렇게 하면 최초에 상장간막의 기시부에서 실시한 혈관 조영상에 나타나지 않던 출혈 부위가 잘 관찰되기도 한다.

혈관 색전술

가) 색전물질의 선택

색전물질은 출혈병변의 위치와 병리에 따라 달라진다. 영구적으로 혈관의 색전이 병의 치료에 도움이 된다면 stainless coil, PVA particle등과 같은 영구 색전물질을 사용하는

Fig. 2. Identification of bleeding focus from motion artifact of DSA.

A. Could you find the bleeding focus on this image of DSA?

B. After removal of subtraction image of DSA. Still couldn't you find out the bleeding focus?

C. Late arterial phase of same angiography. The extravasated contrast dye is filling along the mucosal folds of jejunum(arrows).

것이 좋을 것이다. 그러나 일정한 시간이 경과 후 혈관 재개통을 원한다면 자가응고혈전, 젤폼 절편 등과 같은 일시적인 색전물질을 사용하는 것이 좋을 것이다. 출혈부위의 capillary bed까지 완전히 색전해도 무방하다면 액체로 된 색전물질을 사용하는 것도 좋겠지만 이럴 경우 목표장기나 목표부위의 경색이 발생하여 장괴사와 같은 이차적인 합병증이 발생할 가능성이 많으므로 대부분의 경우 출혈 혈관의 혈액흐름을 일시적으로 차단하거나, 혈압을 낮추어 지혈하는 방법을 택하며 따라서 고형질의 색전물질이 안전하다.

나) 색전부위의 선택

색전부위의 선택은 색전술의 성공에 아주 중요하다. 너무 근위부의 혈관을 막는다면 색전 부위 이하의 측부혈행으로 인해 지혈이 되지 않을 가능성이 많으며, 너무 원위부를 막으면 조직의 경색을 피할 수 없게 되기 때문이다. 그러므로 출혈부위의 해부학적인 구조에 대한 이해가 필요하며, 특히 측부혈행에 대한 이해가 필수적이다.

(1) 상부위장관

상부위장관은 아주 풍부한 혈관문합을 통한 측부혈행을 가지고 있으므로 웬만큼 색전술을 시행하더라도 색전에 따른 조직이나 장기의 경색이 여간해서 발생하지 않는다. 그러나 혈관문합이 풍부하다는 것은 색전을 확실하게 하지 않았을 경우 원하는 지혈목적을 얻을 수 없다는 뜻과도 상통한다.

위장으로 주행하는 혈관은 left and right gastric a., left and right gastroepiploic a., short gastric a.가 있으며, 일부의 위장이 gastroduodenal a.와 inferior phrenic a.에 의해 혈류 공급을 받는다. 해부학적인 변이로 accessory gastric a.가 left hepatic artery에서 기시하거나, 반대로 left gastric a.에서 left hepatic a.가 기시하는 경우가 약 20% 정도 있다.

(2) 하부위장관

소장 출혈에 대한 색전술은 출혈 혈관의 압력을 낮추어 자발적인 지혈을 이루는 데 있다. 소장의 허혈이나 장의 경색으로 인한 장괴사가 약 20%에서 발생하는데 이는 색전할 혈관의 위치를 잘못 선정하거나, 너무 심한 색전을 하여 vasa recta의 mural branch까지 막음으로서 발생하는 것이다. 이를 피하기 위해서 가능한 미세카테터를 이용하여 목표혈관을 초선택하도록 하고, vasa recta 근처의 혈관 궁(arcade)까지 골라들어가는 것이 좋다. 초선택이 되지 않을 경우 분절동맥(segmental artery)의 근위부에서 혈류를 떨어뜨릴 정도만 색전하는 것이 안전하나, 너무 근위부에서 광범위하게 색전하면 측부혈행의 부족으로 장괴사가 발생할 가능성이 높으므로 주의한다.

대장은 소장보다 anastomosing mural arterial network(vasa recta)의 발달이 소장보다 빈약하기 때문에 출혈의 색전술 뒤 장의 괴사가 잘 발생하는 것으로 알려져 있다. 그

러므로 Drummond 연동맥(Marginal artery of Drummond)를 기준으로 근위부에서 색전술을 시행하는 것이 안전하다. 그러나 하부위장관 중 직장은 비교적 풍부한 측부혈행을 가지고 있기 때문에 색전치료에 따른 장괴사의 합병증 발생이 상대적으로 아주 낮다. 하부 위장관 전체의 색전 치료 후 재출혈의 가능성이 10-20%에 이르며, 재색전을 시행하거나, 수술로서 출혈을 치료해야 한다.

직장에 혈류를 공급하는 혈관은 superior rectal a., middle rectal a., inferior rectal a.가 있으며, 각각 inferior mesenteric a., midsacral a., internal iliac a.의 분지들이다. 직장이 비교적 많은 측부혈행을 가지고 있는 것은 직장이 후복막강에 쌓여 있는 것과 밀접한 관계가 있다. 직장의 출혈이 의심되는 경우 위의 가지 혈관들을 모두 검사하는 것이 필요하다.

위에 열거된 원인으로 색전을 시행할 경우 자가응고혈전이나 젤폼절편으로 색전하여 좋은 결과를 얻을 수 있다. 최근의 논문들에서 출혈 혈관을 vasa recta까지 초선택하여 micro-coil이나 PVA particle을 이용하여 좋은 색전 효과를 보고하는 논문들이 많이 있다. 그러나 stainless coil은 혈관이 초선택되지 않을 경우 출혈의 상부 근위부에서 막을 가능성이 많으므로 삼가는 것이 좋다.

다) 부위별 색전술

(1) 위장 출혈

위장 출혈의 가장 많은 원인으로 스트레스성 궤양, 소화성 궤양, 암출혈 등이 있다. 스트레스성 궤양은 주로 위의 저부와 체부에 발생하며, 소화성 궤양은 유문부 주위에 주로 발생한다. 위장 출혈의 원인혈관으로 left gastric a.가 85%를 차지하며, right gastric, short gastric a.가 각각 5%정도 gastroepiploic a.가 3%로 알려져 있다. 그러므로 급성 상부 위장관 출혈의 가장 중요한 출혈 혈관은 Left gastric artery(LGA)이다. LGA는 모든 Mallory-Weiss씨 출혈과 스트레스성 궤양, 80%의 isolated pumping ulcers, 그리고 85%의 상부 위장관 출혈을 담당하는 중요한 혈관이다. 위장 출혈 환자에서 출혈병변을 찾을 수 없는 경우도 약 15-20%가량되므로 출혈혈관이 보이지 않는다하여 색전을 시행하지 않는다면 환자는 다시 엄청난 대량출혈을 일으킬 가능성이 많다. 이런 환자에서 비록 출혈부위를 확인 하지 못하였지만 LGA를 막은 환자는 유의성있는 재출혈을 일으키지 않는다. 즉 출혈을 찾지 못한 경우 LGA를 막으면 약 15%미만의 예에서만 목표점을 찾지 못하는 것이다.

그러나 역시 중요한 것은 출혈의 부위를 찾고, 색전을 하는 것이기 때문에 혈관 조영전에 출혈의 부위를 대충이라도 알고 시술에 임한다면 많은 시간을 절약할 수 있으며, 효과적인 색전을 할 수 있다(Table 1).

(2) 십이지장 궤양의 급성 출혈(Fig. 3)

십이지장은 Gastroduodenal artery(GDA)와 상장간동맥

의 가치를 통해 혈관 공급을 받는다. 그러므로 십이지장의 출혈은 반드시 두 혈관을 검사하여야 한다. 어느 한쪽만을 검사하고 색전을 마친 경우 불완전한 색전으로 인해 재출혈 가능성이 많다. 많은 참고문헌에도 십이지장궤양으로 인한 출혈의 색전치료가 성공률이 가장 낮은 것으로 보고하고 있는 것도 혈관 분포와 연관이 있을 것으로 보인다.

GDA의 근위부를 색전한 후 재출혈 할 가능성이 높다. 그러나 terminal muscular branch를 색전하면 재출혈의 가능성은 줄어드나 색전 후 합병증으로 십이지장의 협착과 폐쇄가 발생할 가능성이 높다. muscular branch의 색전으로 인한 십이지장의 협착은 조직의 아주 심한 저산소증과 무혈관성 괴사로 인한 것으로 사료된다. 하지만 후복벽장기이기 때문에 괴사가 발생하더라도 장이 천공 될 가능성은 적은 것으로 여겨진다.

GDA의 색전은 혈액의 흐름은 약 50% 정도 낮추나 perfusion은 85% 정도 감소시킨다. 따라서 GDA를 색전하면 출혈 부위의 혈압이 효과적으로 낮아져 지혈목적을 얻을 수 있다. 색전의 일차목표가 단순 지혈만이 목적이라면 자가응고혈전으로 색전하는 것이 좋은 방법으로 추천된다. 이 방법은 궤양을 덮고 있는 혈전에 섬유소세포(fibrocytes)가 이동할 수 있

는 2-5일 동안만 색전 효과가 있기 때문에 궤양의 치료에 좋은 방법이다. 하지만 재출혈의 가능성이 약 50%이다. 재출혈 했을 때 재색전을 시도하고, 이때는 terminal branch를 영구색전물질로 막는 것이 추천되고 있다. 따라서 색전의 목적에 따라 색전물질을 선택하는 것이 좋다.

(3) 궤장염에 동반된 가성동맥류의 치료

궤장염은 여러 종류의 합병증을 나타낼 수 있지만 혈관에 발생하는 합병증으로 가성동맥류가 있다. 궤장염에 의한 가성동맥류가 있을 경우 다양한 증상들이 발생할 수 있으므로 주의깊게 환자의 증세를 확인하고, 가성동맥류에 의한 것인지 확인할 필요가 있다. 궤장염에 의한 가성동맥류는 가성동맥류 파열로 인한 사망률이 50%이상이므로 궤장염에 의한 가성동맥류는 색전 치료가 매우 중요하다.

궤장염에 의한 가성동맥류의 색전은 영구색전 물질을 사용하여 색전 하는 것이 가장 좋은 방법이나, 그밖의 색전 물질을 상황에 따라 사용할 수 있다.

궤장염의 가성동맥류는 GDA가 가장 흔한 원인 혈관이며, 그밖에도 splenic artery, inferior pancreaticoduodenal a., dorsal pancreatic a., middle colic a. 등이 주 혈관이다. 색전을 시행할 때 가성동맥류와 너무 떨어진 근위부 혈관에 색전

Fig. 3. Duodenal ulcer bleeding. **A,B.** The extravastion is noted on the posterior pancreaticoduodenal artery from gastroduodenal artery of celiac trunk, and same branch from superior mesentric artery. **C,D.** Using microcatheter with gelfoam pledgets, the bleeding vessel was embolized effectively through celiac trunk and SMA.

을 하면 측부혈행을 따라 다시 가성동맥류에 혈액의 흐름이 재개되므로 가능한 가성동맥류의 입구를 초선택하는 것이 중요하다. stainless coil로 색전할 때 가성동맥류에 너무 심한 압력이 가해져 가성동맥류의 혈관을 파열 시키지 않도록 조심스럽게 색전한다.

(4) 급성 하부 위장관 출혈

Treitz 인대의 상방에서 발생하는 장출혈은 상부 위장관 출혈에 비해 색전치료가 조심스러운데 그 이유는 위장이나 십이지장에 비해 혈관의 분포가 제한적이며 vessel overlapping이 적기 때문이다. 하부위장관은 직장을 제외하고 상부 위장관에 비해 측부혈행이 확실하지 않다. 단지 상장간동맥과 하장간동맥 사이의 혈관문합이 측부혈행의 대부분을 차지할 뿐이다. 즉 하부 위장관의 출혈 시 조금 지나친 색전은 목표장기나 부위의 허혈, 경색을 초래하기 쉬우며, 원치않는 합병증이 발생하기 쉽다.

사용하는 색전 물질로 젤폼 절편, stainless coil, PVA particle 등이 있으나, 항상 혈관을 초선택하여 색전한다는 것을 명심한다(Fig. 4).

하부 위장관 출혈의 원인으로는 가장 많은 것이 전체 하부 위장관 출혈의 10%를 차지하고 있는 상부 위장관 출혈이 원인이며 상부 위장관의 출혈 양이 많을 경우에 하부 위장관 출혈로 오인할 수 있다 반드시 비위관(nasogastric tube)을 이용해 흡입검사를 시행하거나 내시경을 실시하여 상부 위장관 출혈이 아니라는 것을 증명하여야 한다.

그밖의 하부 위장관 출혈의 원인으로 게실증, angiodysplasia (= AV malformation, vascular ectasia, angioectasia), 용종제거술 후 출혈, 대장 종양의 출혈, 각종 대장염, 대장궤양증, 혈관염, 장티프스, 대장 혹은 직장의 혈관종 등이 원인이 될 수 있다.

게실증은 서구에서 하부 위장관 출혈의 가장 많은 원인이며, 하행대장에 게실의 80%가 위치하나, 출혈을 일으키는 게실증의 약 50%가 상행 대장에서 발생한다. Angiodysplasia는 후천적인 병변으로 생각하고 있으며, 40대 이전에는 드물다. 일시적인 장내 intramural pressure의 상승으로 인한 점막하 정맥에 간헐적인 혈류 흐름 차단이 발생하여, 반복적인 장출혈을 초래한다. 약 80%가 상행 대장에 위치하며, 그밖에 하행 대장, 소장에 발생한다. 하부 위장관 출혈환자에서 우연히 발견하는 경우가 많다. 대부분 저절로 출혈이 멎으나 85%에서 재출혈한다.

각종 대장염에 의한 장 출혈환자는 색전술로 근본적인 장염이 치료되는 것이 아니므로 색전술로만 효과적인 지혈을 얻을 수 없다. 비록 출혈 혈관을 찾았더라도 혈관 범위가 너무 넓은 경우가 많으며, 조금 심한 색전은 장의 허혈성 괴사를 초래할 가능성이 높고, 범위를 좁혀 색전치료 한 뒤에도 재출혈 가능성이 항상 높다. 그러므로 대장염의 출혈은 상부 위장관의 십이지궤양과 함께 혈관 색전술로 임상적 성공(clinical success)을 얻기가 가장 힘든 출혈 질환 중의 하나이다(Fig. 5).

Table 1. 상부위장관 출혈의 검사 및 치료 모식도

from reference 15

색전 치료의 예후

장출혈 환자의 생존은 치료할 당시의 환자의 상태에 따라 달라지며, 장출혈의 사망원인은 대부분 복합장기부전증(multi-organ failure)인 경우가 많다. 전신 허혈에 빠져있는 시간의 정도와 수혈의 양이 많을수록 응고인자 V, VIII의 결핍으로 인해 복합장기부전증에 빠질 가능성이 많다(Table 2).

일반적으로 대량 수혈이란 24시간 이내 10 pints 이상의 혈액 수혈의 경우를 말한다. 저자들의 연구에서도 평균 10.8 pints 이상의 수혈을 받은 환자는 partial thromboplastin time(PTT)와 prothrombin time(PT)가 비정상 범위로 늘어나 있었으며, 정상 PTT와 PT를 가진 환자군과 비교하였을 때 효과적인 색전술에도 불구하고 재 출혈할 기회와, 지혈 실패로 인한 사망율이 아주 높은 것으로 나타나 있다. 그러므로 가능한 수혈을 많이 하지 않은 상황에서 색전 치료 등과 같은

적절한 치료를 할 수 있도록 치료방침의 빠른 결정이 필요하며, 중재적 시술 중에도 혈관의 선택에 너무 많은 시간이 걸리는 경우 과감히 다른 치료방법으로 이행하도록 한다.

불완전한 색전치료는 오히려 환자를 더욱 위태하게 할 수 있다. 위장관 출혈의 경피적 지혈 성공률은 장기에 따라 다르지만 25%-100%로 보고되고 있으나, Society of Cardiovascular and Interventional Radiology에서 권고하는 치료성공역치(Threshold of success rate)는 75%-90%이다(Table 3). 또한 경피적 지혈치료에 따른 주요 합병증의 발생

Table 2. Mortality After Embolotherapy According to Coagulopathy

	With coagulopathy	Without coagulopathy
Mortality	64%(9/14) 53.8(7/13)	13%(2/15) 6.3(1/16)

from references 5,40

Fig. 4. Embolization of lower GI bleeding.

A. There is a bleeding on the distal jejunum from metastasis of renal cell carcinoma.

B. The microcoils were deployed in the vasa recta around the bleeding focus. Then the bleeding from metastatic mass was stopped. (The position of bleeding focus was moved by peristalsis)

Fig. 5. Ileocecal bleeding from tuberculous enterocolitis.

A. The hypertrophic vasa recta with dense staining of mucosa are noted on early arterial phase.

B. After embolization with gelfoam pledgets. There are seen a few vasa recta, which prevents bowel ischemia.

Table 3. Success Rate for Percutaneous Transcatheter Embolization

Success rates	Reported rate(%)	Threshold(%)
Upper GI bleeding	62-100	75
Focal gastroesophageal (Mallory-Weiss, Gastric ulcer)	71-100	90
Hemorrhagic gastritis (vasopressin is usually first)	25-78	70
Duodenal ulcer (benign)	72-100	
Technical success		90
Clinical success		60
Small bowel and colonic bleeding	93-100	n/a
Pancreatic pseudoaneurysm	100	90

from references: 21,22,33,41

Table 4. Major Complication Rates and Suggested Threshold for Percutaneous Transcatheter Embolization

Complication	Rate (%)	Suggested threshold (%)
Sepsis	<1	1
Abscess	0.3-4.8	1
Target ischemia	0.4-8	4
Nontarget embolization	0.6-5.5	2.5
Hemorrhage	<1	<1
Spinal infarction	0.3-0.9	<1
Death(procedure-related)	0.9-2	1
Overall major complications	0.6-12	6

from reference 41

의 권고역치는 4%이내 (target ischemia 4% - hemorrhage 1%이내)이다(Table 4).

결론적으로 위장관의 출혈은 환자의 상태를 급격히 악화시키며, 대량수혈로 인한 응고장애의 발생, 복합장기부전증의 출현 등으로 환자가 사망할 가능성이 높다. 그러므로 응급 혈관 색전술은 환자의 상태를 개선하거나, 효과적인 치료를 받을 상태로 환자를 되돌리기 위한 방법이며, 지혈을 위한 제일 좋은 선택이 되는 경우가 많다. 그러나 어떤 종류의 치료법이건 치료의 시기를 놓치지 않는 것이 가장 중요하듯이 지혈을 위한 혈관 색전술 역시 치료시기가 매우 중요하다. 가장 좋은 시기는 초기의 대량 출혈이 있을 때 시간의 지체없이 바로 색전술을 시행하는 것이며, 이런 경우 대부분의 출혈병소를 확인할 수 있고, 이차적인 합병증없이 지혈과 치료의 효과를 얻을 수 있는 좋은 방법이며 환자의 critical care에 필수적인 방법이라 할 수 있다.

참 고 문 헌

- Nusbaum M, Baum S, Blakemore WS, et al. Clinical experience with selective intra-arterial infusion of vasopressin in the control of gastrointestinal bleeding from arterial sources. *Am J Surg* 1972;123:165-172
- Rollins ES, Picus D, Hicks ME, et al. Angiography is useful in detecting the source of chronic gastrointestinal bleeding of obscure origin. *AJR* 1991;156:385-388
- Sheedy PF, Fulton RE, Atwell DT. Angiographic evaluation of

patients with chronic gastrointestinal bleeding. *AJR* 1975;123:338-347

- Kandarpa K., Aruny JE. Acute gastrointerstitial bleeding. in *Handbook of interventional radiologic procedures*. 2nd edi., Little Brown and Company, Boston USA 1996:130-138
- Encarnacion CE, Kadir S, Beam CA, Payne CS. Gastrointestinal bleeding: treatment with gastrointestinal arterial embolization. *Radiology* 1992;183:505-508
- Eckstein MR, Kelemouridis V, Athanasoulis CA, et al. Gastric bleeding: therapy with intraarterial vasopressin and transcatherter embolization. *Radiology* 1984;152:643-646
- Feldman L, Greenfield AJ, Waltman AC, et al. Transcatheter vessel occlusion: Angiographic results versus clinical success. *Radiology* 1983;147:1-5
- Fisher RG, Schwartz JT, Graham DY. Angiotherapy with Mallory-Weiss Tear. *AJR* 1980;134:679-684
- Rees CR, Palmaz JC, Alvarado R, et al. DSA in acute gastrointestinal hemorrhage: clinical and in vitro studies. *Radiology* 1988;169:499-503
- Rahn NH, Tishler JM, Han SY, et al. Diagnostic and interventional angiography in acute gastrointestinal hemorrhage. *Radiology* 1982;143:361-366
- Encarnacion CE, Kadir S, Beam CA, Payne C. Gastrointestinal bleeding: treatment with gastrointestinal arterial embolization. *Radiology* 1992;183:505-508
- 신길현, 오주형, 윤연. 대량의 대장출혈의 경도자 색전술. *대한방사선 의학회지* 1996;34(1):47-51
- Kelemouridis V, Athanasoulis CA, Waltman AC. Gastric bleeding sites: an angiographic study. *Radiology* 1983;149:643-648
- Lang EV, Picus D, Marx V, et al. Massive arterial hemorrhage from the stomach and lower esophagus: impact of embolotherapy on survival. *Radiology* 1990;177:249-252
- Lang EV, Picus D, Marx MV, et al. Massive upper gastrointestinal hemorrhage with normal findings on arteriography: value of prophylactic embolization of the left gastric artery. *AJR* 1992;158:547-549
- Toyoda H, Nakano S, Takeda I, et al. Transcatheter arterial embolization for massive bleeding from duodenal ulcers not controlled by endoscopic hemostasis. *Endoscopy* 1995;27:304-307
- Lang EK. Transcatheter embolization in management of hemorrhage from duodenal ulcer: long-term results and complications. *Radiology* 1992;182:703-707
- Reber PU, Baer HS, Patel AG, et al. Life threatening upper gastrointestinal tract bleeding caused by ruptured extrahepatic pseudoaneurysm after pancreatoduodenectomy. *Surgery* 1998;124:114-5
- Mauro MA, Jaques P. Transcatheter management of

- pseudoaneurysms complicating pancreatitis. *JVIR* 1991;2:527-532
20. 심재인, 박오환, 염현규, 김용주 위장관 출혈의 경피경관색전술 대한 방사선의학회지 1994;30(5):823-828
 21. Gordon RL, Ahl KL, Kerlan RK, et al Selective arterial embolization for the control of lower gastrointestinal bleeding. *Am J Surg.* 1997;174:24-28
 22. Peck DJ, McLoughlin RF, Hughson MN, et al. Percutaneous embolotherapy of lower gastrointestinal hemorrhage. *JVIR* 1998;9:747-751
 23. Zuckerman DA, Bocchini TP, Birnbaum EH. Massive hemorrhage in the lower gastrointestinal tract in Adults: diagnostic imaging and intervention. *AJR* 1993;161:703-711
 24. Defreyne L, Verstraeten V, Potter CD, et al. Jejunal arteriovenous malformation, diagnosed by angiography and treated by embolization and catheter-guided surgery: case report and review of literature. *Abdom Imaging* 1998;23:127-131
 25. Valki N, Huilgol V, Khan I. Effect of push enteroscopy on transfusion requirements and quality of life in patients with unexplained gastrointestinal bleeding. *Am Coll of Gastroenterology* 1997;92(3):425-428
 26. Malden ES, Hicks, ME, Royal HD, et al. Recurrent gastrointestinal bleeding: use of thrombolysis with anticoagulation in diagnosis. *Radiology* 1998;207:147-151
 27. Locker GJ, Staudinger T, Knapp S, et al. Prostaglandin E1 inhibits platelet decrease after massive blood transfusion during major surgery: influence on coagulation cascade? *J trauma* 1997;42(3):525-531
 28. Gee MH, Tahamont MV, Flynn JT, et al. Prostaglandin E1 prevents increased lung microvascular permeability during intravascular component activation in sheep. *Circ Res* 1987;61:420-428
 29. Glickerman DJ, Kowdley KV, Rosch J. Urokinase in gastrointestinal tract bleeding. *Radiology* 1988;168:375-376
 30. Merngh JR, O' Donovan AN, Somers S, Gill S, Laplante S. Use of heparin in the investigation of obscure gastrointestinal bleeding (abstr). *Radiology* 1996;201(p):384
 31. Al-Mohana JMA, Lowe GDO, Murray GD, et al. Association of fibrinolytic tests with outcome of acute upper-gastrointestinal-tract bleeding. *Lancet* 1993;341:518-21
 32. Hartnell GG, Gates J. Treatment of gastroduodenal artery hemorrhage with a conventional stent. *JVIR* 1999;10:172-174
 33. Guy GE, Shetty PC, Sharma RP et al Acute lower gastrointestinal hemorrhage: treatment by superselective embolization with polyvinyl alcohol particles. *AJR* 1992; 159:521-526
 34. 이동현, 진공용, 오희술 등. 장간막동맥의 색전술에 있어서 금속코일과 젤폼 색전 위치에 관한 실험적 연구. 대한방사선의학회지 1998;39:59-65
 35. Bakal CW, Cynamon J, Lakritz PS, et al. Value of preoperative renal artery embolization in reducing blood transfusion requirements during nephrectomy for renal cell carcinoma. *JVIR* 1993;4:727-731
 36. Faringer PD, Mullins RJ, Johnson RL, Trunkey DD. Blood component supplementation during massive transfusion of AS-1 red cells in trauma patients. *J Trauma* 1993;34(4):481-487
 37. Duszak R, Haskal ZJ, Sacks D, et al. Massive hemolysis: a rare complication of transcatheter coil embolization. *JVIR* 1996;7:603-606
 38. Ledermann HP, Schoch E, Jost R, Decurtins M, Zollikofer CL. Superselective coil embolization in acute gastrointestinal hemorrhage: personal experience in 10 patients and review of the literature. *JVIR* 1998;9:753-760
 39. Tawes RL Jr., Sydorak GR, Duval TB, et al. Avoiding coagulopathy in vascular surgery. *Am J Surg* 1990;160:212-216
 40. 서석빈, 박병호, 서금수 등. 대량 출혈시 발생한 응고장애가 위장관출혈에 미치는 영향. 대한방사선의학회 춘계학술대회 초록집 1999:91
 41. Drooz AT, Lewis CA, Allen TE, et al. Quality improvement guidelines for percutaneous transcatheter embolization. *JVIR* 1997;8:889-895

Embolization of the Portal Vein

성 규 보

울산대학교 의과대학 서울중앙병원 진단방사선과

서 론

부분적인 간절제술은 오랜 역사를 가진 수술방법으로 외과 의사들은 악성종양 등의 치료 방법으로 좀 더 광범위한 간절제술의 필요성을 느끼게 되었다. 그러나 광범위한 간절제술은 수술 후 남게 되는 간엽의 기능과 부피 때문에 간기능 부전의 위험성이 있다. 이러한 문제를 해결하는 한가지 방법으로 간절제술 후 남게 되는 간엽의 부피를 키울 목적으로 문맥색전술을 시행하게 되었다.

오래 전에 Rous 등이 문맥의 일부를 결찰 하면 그 부위의 간 실질은 위축이 오고 결찰 하지 않은 부위에는 비대가 오는 것을 동물실험을 통하여 보고하였다. 그 현상이 나타나는 이유는 문맥은 간 혈류의 75-80%를 공급하는 주 영양 공급 혈관이기 때문으로 간동맥을 막은 경우에는 볼 수가 없는 현상이다. 또 간문부담도암(Klatskin tumor) 등으로 인하여 한쪽 간엽의 문맥이 막히면 그 부위의 간엽에 위축이 오는 것을 Takayasu 등(1)이 1986년도에 보고하였다. 이러한 문맥폐쇄로 인한 간엽의 위축을 인위적으로 유도하여 대량간절제술의 안전성을 높이기 위한 방법은 1990년 일본의 외과의사인 Makuuchi 등(2)에 의하여 처음으로 시도되어 더욱 적극적인 대량간절제술을 안전하게 할 수 있는 계기를 만들었다(3,4). 처음 문맥색전술을 시행할 때는 개복 후 상복막정맥 분지를 통하여 시술하는 방법을 사용하기도 하였으나 현재는 모두 경피경간적인 경로로 간내 문맥 분지를 천자하여 시술하는 방법을 사용하고 있다. 방사선과 분야의 문헌에는 1993년 de Baere 등(5)이 처음 보고 하였으며, 국내에서는 1991년 9월 첫 시술이 시작되어 이에 대한 논문들(6,7)이 보고 되기 시작하였다.

앞에서 언급한 바와 같이 문맥색전술은 원인 질환의 종류에 관계없이 대량간절제가 예정된 환자에서 수술 후 간부전을 줄이기 위하여 시행되는 수술 전 처치이므로 반드시 수술이 예정된 환자에서 시행하여야 하며 절제할 간부위 문맥을 폐색하는 시술이다. 수술로 절제할 간 부위의 문맥의 혈류를 차단하여 그 부위를 위축시키고 수술 후 남게 되는 간엽의 대상성 비대를 유도하고, 수술 후 발생하는 문맥 혈류 및 압력의 증가를 수

술 전에 경험하게 해 줌으로서 수술 후의 상황에 대비하는 것이다. 간세포암의 수술에서는 수술 중에 문맥을 통한 전이를 방지하는 효과도 기대할 수 있다. 일반적으로 부피가 큰 우엽 절제술 이상의 간절제술이 대상이 되나 좌엽이 우엽과 비교하여 부피가 큰 환자에서는 좌엽절제술이 예정된 환자에서도 시행한다.

문맥색전술은 개통되어 있는 문맥의 혈류를 차단하기 위하여 하는 시술임으로 간세포암 또는 간문부담도암 등으로 문맥이 폐색 되어 있는 환자는 적응증이 되지 않는다. CT 등의 검사에서 문맥이 개통되어 있는 것을 확인하여야 하며, 간혹 질이 나쁜 CT로 인하여 문맥의 개통여부가 확실치 않은 경우에는 다시 검사를 시행하여야 한다.

문맥색전술을 시행한 후 평균 2주 후에 간절제술을 시행하며 수술 전에 CT를 시행하여 간 비대의 정도를 검사한다.

시술 방법

1. 문맥 천자

경피경간경로로 간내 문맥 분지 천자 시에는 간실질의 손상, 혈종 등의 합병증이 발생할 수 있으므로 절제할 간엽에서 천자를 시행하는 것이 안전한 방법이다. 우엽 문맥의 천자 시에는 중간액와선 상에서 늑간을 통하여 제 6 간분절 또는 제 5 간분절의 문맥 분지에서, 좌엽 문맥 천자 시에는 상복부에서 제 3 간분절 또는 제 2간분절 문맥 분지에서 시행한다(Couinoud Classification).

천자 경로에 간세포암 등의 악성종양이 있는 경우에는 이 부위를 통과하여 시술하는 것은 금기 사항이다. 이러한 경우에는 잔존간이 될 간엽에서 문맥 천자를 시행하는 방법과, 일차적으로 경동맥화학색전술을 시행하여 종양의 부피가 감소한 1-2개월 후에 절제할 간엽을 천자하는 방법, 종양이 다소 작은 경우에는 호흡을 조절하여 천자 경로에서 종양이 벗어나도록 하여 문맥을 천자하는 방법을 사용한다.

문맥 천자는 반복 시도해서 성공하는 경우가 많으므로 21 gauge 주사침을 사용하는 것이 안전하다. 간내문맥분지의 천자 및 모철사(hair wire)의 삽입과정에서 간내 담도의 천자와

는 두 가지의 틀린 점이 있다. 한가지는 조영제를 주입하였을 때 담도는 조영제가 정체되어있어 모칠사 삽입 시 유도해 주는 역할을 하는 반면에 문맥의 경우에는 혈류의 흐름에 따라 순식간에 없어진다. 또 한가지는 말초부의 작은 문맥이 천자 된 경우에는 담도 만큼 모칠사의 삽입이 용이하지 않다는 점이다. 즉 다소 큰 문맥분지가 천자 되어 주사침을 통하여 문맥혈을 아무 저항 없이 주사기로 뽑아낼 수 있어야 모칠사의 삽입이 용이하다. 문맥이 천자 된 후 경로를 확장하여 피포(check flow sheath)를 문맥까지 삽입하여 색전술을 시행하는 동안 카테타 조작으로 인한 필요 없는 자극을 피하도록 한다. 이 때 사용하는 피포의 크기는 5-6 F로 색전술에 사용하는 카테타 삽입이 가능한 최소 크기의 피포를 사용한다.

2. 문맥조영술

문맥조영술은 문맥의 정상변이와 종양의 문맥 침범 유무를 알기 위한 목적으로 시행한다. 피포를 통하여 5F, 2개의 측공이 있는 cobra 카테타를 삽입하여 주문맥조영술을 시행한다 (Fig. 1A). 측공이 없는 cobra 카테타는 문맥 벽에 밀착되어 혈액이 역류되지 않는 경우가 발생하므로 측공이 있는 카테타를 사용하는 것이 편리하다. 비장정맥이나 상장간막정맥에서 조영제를 주입하는 경우에는 주문맥 내에서 편측 혈류(laminar flow)를 이루어 우엽 또는 좌엽 문맥이 조영되지 않는 경우를 볼 수도 있다. 또 주문맥에서 조영제를 주입할 때는 후상 췌십이지장정맥이 선택되지 않도록 주의하여야 한다. 주문맥 조영술상 좌엽의 중분절과 우엽 문맥 분지는 주문맥조영술에서 앞뒤로 중첩되어 보이므로 선택적 좌엽문맥조영술을 시행하여 감별하여야 한다(Fig. 1B). 주문맥조영술시 조영제는 7cc/초로 4초간 주입하면서 1초에 1장씩 10초 동안 촬영한다. 좌엽문맥조영술은 조영제를 4cc/초로 4초간 주입하면서 1초에 1장씩 10초 동안 촬영한다.

문맥은 정상변이가 많지 않은 것으로 알려져 있고 문맥색전술을 시행하기 전까지는 해부학적인 정상변이를 이해하는 것이 방사선과 의사에게는 흥미 이상의 부분이 아니었다. 그러나 문맥색전술을 하기 위하여서는 정상변이를 포함한 해부학적인 이해가 필수적이다. 우리가 알고 있는 정상적인 주문맥의 분지 방법인 주문맥에서 좌엽 및 우엽 문맥분지로 나뉘는 경우는 84.0%(136/163)이며, 우후간분절 분지가 주문맥에서 분지하는 경우가 4.3%(7/163), 주문맥이 우후간분절, 우전간분절 및 좌엽 문맥 분지의 3개로 동시에 분지되는 경우가 8.6%(14/163), 우전간분절 분지가 좌엽 문맥에서 분지 되는 경우가 3.1%(5/163)였다 (Fig. 2). 즉 3.1%의 환자에서는 정상적으로 좌엽 문맥에서 나오는 좌중간분절(제 4 간분절)문맥분지와 정상 변이인 좌측문맥에서 분지 되는 우전간분절분지의 감별이 필요하며, 이 결정은 우측 문맥색전술시 색전을 해야 되는가 안 해야 되는지의 결정이 된다. 또 우리가 비교적 쉽게 변이를 알 수 있고 문맥색전술시 알아야 하는 우후간분절 분지도 하나로 분지되는 경우는 83.6%(133/159)이며, 5.0%(8/159)는 제 7 간분절과 제 6 간분절이 따로 분지 되고 있으며, 나머지 11.4%(18/159)는 3개 이상의 우후간분절 분지가 보인다(Fig. 3). 우후간분절의 문맥 분지가 하나라고 생각하고 우측간엽의 전, 후간분절 문맥 분지를 각각 선택하여 색전술을 시행하거나 폐색풍선카테타를 사용하여 우엽문맥분지에서 혈류를 차단하고 문맥색전술을 시행할 때 여러 개의 우후간분절 분지 중 일부만 포함하여 불완전한 시술을 하게 되는 원인이 되므로 꼭 알고 있어야 할 변이이다.

3. 문맥색전술 및 색전물질

문맥색전술도 색전술의 일반적인 원칙대로 색전을 계획한 부위는 완전하게 폐색하고 폐색이 되지 않아야 할 부위로는 색전물질이 역류 되지 않도록 유의해야 한다. 우엽 문맥색전술

Fig. 1. Main portal venography(A) and selective left portal venography(B)

Digital subtraction portal venogram(A) obtained in the main portal trunk showed no anatomic variation or encasement of portal vein. Selected left portal venogram(B) was also obtained for differentiation between overlapped right portal vein and medial segmental branch of left portal vein.

Fig. 2. 문맥의 정상변이

은 우엽 문맥의 1차 분지까지 시행하며 계획된 수술에 따라 좌엽 또는 좌엽과 우전간분절, 우엽과 좌중간분절 부위를 색전하기도 한다.

현재까지 사용이 보고된 색전물질로는 젤라틴스폰지 조각, 스테인레스스틸 코일, 무수알코홀, cyanoacrylate, fibrin glue 등이 있다. 가장 보편적으로 사용할 수 있는 색전물질은 젤라틴스폰지 조각으로 적당한 크기(2×2mm)로 절단하여 항생제(Gentamycin, 80mg)와 조영제 원액에 적셔 사용한다. 조영제에 적신 젤라틴스폰지 조각은 주입시 투시상 잘 보이며 같이 주입되는 조영제로 혈류가 막히는 정도를 쉽게 알 수 있다. 우엽 문맥색전술에 사용되는 젤라틴스폰지의 양은 환자나 간의 크기에 따라 차이가 있으나 평균 7×5×1cm 크기의 젤라틴스폰지 1장 정도로 간세포암의 경동맥화학색전술 때 평균적으로 사용하는 양의 10배 이상이다. 젤라틴스폰지 조각은 5 F 코브라카테타나 폐색풍선카테타를 통하여 주입한다. 스테인레스스틸코일은 근위부에서 문맥이 폐색 됨으로 효과 면에서 떨어지며, 비용이 비싸게 드는 단점이 있어 사용을 하지 않는 것이 좋다. 무수알코홀은 간의 심한 괴사를 초래할 수 있어 시술 후 환자가 통증, 발열 등 심한 색전후증후군을 동반하고 비교적 사용이 까다로운 물질이다. Cyanoacrylate는 액상색전물질로 효과적인 면에서 우수하지만 여러 개의 마이크로카테타를 사용하여야 하므로 비싼 시술 방법이며, 리피오돌을 섞어 굳는 속도를 조절할 수 있으나 굳는 속도가 빨라 카테타 끝이 붙을 수 있으므로 사용에 경험이 필요하다. 또 색전을 시행하는 반대쪽 즉 잔존간을 천자하여야 하는 문제점이 있다.

현재 서울중앙병원에서는 박 등(8)이 기존에 사용하는 색전물질인 polyvinyl acetate를 부분가수 분해하여 개발한 Embol-78-12라는 액상의 고분자를 색전물질로 사용하고 있다. 이 Embol-78-12는 용매에 알코홀의 농도를 낮추고 조영제의 양을 늘여 방사선비투과성이 뛰어난 물질로서 영구적인 색전 물질로서 문맥의 재개통의 가능성이 없다. 사용 시 혈류가 느린 문맥에서는 고가의 폐색풍선카테타를 사용하여야 하는 문제점이 있으나 재사용이 가능하다. 점도가 높기 때문에 주입시 3-way stopcock을 사용하여 1cc 주사기로 주입하여야 하며 우측 문맥을 폐색하기 위하여서는 20-40cc 정도 사용

Fig. 3. 우후간분절 문맥 분지의 정상 변이

하여야 한다. 주입시 카테타 끝에서부터 원위부로 방사선비투과성이 높은 색전물질이 퍼져나가는 것을 볼 수 있으므로 양의 조절이 쉽고 역류가 되는 것도 알 수 있다. Embol-78-12는 주입 후 용매로 추가되어 있는 알코홀의 농도가 희석되면서 굳어 지므로 10-15분 정도 풍선을 확장시켜 혈류를 차단하여 굳기 전에 역류 되는 것을 방지하는 방법을 사용한다. Embol-78-12는 풍선카테타와 달라 붙는 성질이 없으므로 색전술을 시행하는 간엽을 천자하여 문맥색전술을 시행하여도 문제가 없다. 현재 임상연구 상태이며 주입시 다소의 통증을 동반하며, 이러한 점을 예방하기 위하여 Lidocain을 문맥 내에 주입하고 사용하여도 통증을 완전히 조절하지 못하는 것이 문제점이다.

색전술 후 주문맥조영술을 시행하여 완전히 문맥이 폐색 되고 색전물질이 역류 되지 않은 것을 확인한다(Fig. 4A, B). 색전술을 시행한 후 주문맥까지 카테타를 전진시킬 때는 유도철사를 먼저 조심스럽게 주문맥까지 통과시키고 카테타를 유도철사를 따라 진행시키는 방법을 사용하여 카테타의 진행으로 인하여 색전물질이 역류 되는 것을 방지하여야 한다. 조영제는 6cc/초의 속도로 4초간 주입하면서 1초에 1장씩 10초간 촬영한다.

4. 간실질 경로의 처리

간실질 경로의 폐색이 필요한가에 대하여서는 논란의 여지가 있으나, 안전을 위하여 스테인레스스틸코일 2개로 색전한다.

스테인레스스틸코일을 문맥조영에 사용한 케테타 내로 삽입할 수도 있으나 길이가 길기 때문에 피포 내에 있던 확장기로 바꾸어 시행하는 방법이 편하다. 카테타 내로 유도 철사를 삽입한 후 카테타를 제거하고 유도철사를 타고 피포 내로 확장기를 삽입한다. 절제할 간엽을 천자한 경우에는 확장기를 점차적으로 뒤로 제거하면서 조영제를 주입하면서 피포가 문맥의 혈류를 막아 폐색 되지 않은 문맥이 있는지를 확인하고 개통되어있는 문맥이 있으면 색전술을 시행한 후 간실질인 것을 확인한 후 코일로 경로를 폐색한다. 잔존간이 될 부위의 문맥을 천자한 경우에는 확장기가 완전히 문맥을 벗어난 것을 확인하고 경로를 폐색 시켜 문맥 혈류를 막지 않도록 조심하여야

한다.

담도가 확장되어 있는 환자에서는 담도를 통과하여 간내 문맥이 천자 된 경우가 있으며, 이러한 경우 담도와 문맥사이의 간실질 부위에서 코일로 폐색하고 담도에 배액관을 삽입하여 경피경간담배액술로 경로 처리를 마감하는 방법이 안전하다. 또 간실질 경로가 간정맥을 통과한 경우도 있으므로 코일 주입 시 간실질 임을 꼭 확인하여야 한다.

문맥색전술 후의 변화

1. 문맥압의 변화

문맥색전술 후 문맥압은 평균 4mmHg이 증가하며, 일반적으로 간경변이 있는 환자에서 정상적인 간보다 더 많이 증가하게 된다. 문맥고혈압이 있는 환자에서 문맥압의 증가는 정맥류의 출혈을 유발할 수 있을 것으로 생각되나 출혈이 발생한 경우는 없었다.

2. 색전후증후군과 간기능의 변화

환자의 2/3 정도에서 상복부 통증이 발생하며, 그 중 1/2은 진통제가 필요한 정도의 통증이 나타난다. 발열은 약 2/3에서 경미한 정도로 발생하며 평균 2일간 지속된다. 그러나 이러한 증상은 간동맥색전술과 비교하여 경미한 정도이며 대부분의 환자는 시술 2-3일 후에 퇴원이 가능하다.

문맥색전술 후 GOT, GPT, 빌리루빈, ICG 혈장제거율(ICGR₁₅)은 큰 변화는 없다.

3. 담즙 성질과 배액량의 변화

간문부담도암에서 좌우간엽담도에 각각 배액관이 삽입되어 있는 경우에는 문맥색전술을 시행한 간엽의 배액관에서는 담

즙의 양이 감소하며, 색전술을 시행하지 않은 간엽의 배액관에서는 농축된 담즙의 양이 증가한다. 이러한 담즙의 양과 점도의 변화는 문맥색전술의 성공 여부를 알 수 있는 좋은 지표가 된다.

4. 간부피의 변화

문맥색전술을 시행한 간엽의 부피는 위축되고 색전술을 시행하지 않은 부위의 간엽은 대상성인 비대의 소견을 보인다. 색전술 후 비대의 정도는 색전한 간 부피의 비율, 간경화의 정도 및 색전물질의 종류에 따라 차이가 있을 수 있다.

이러한 변화는 나선형 CT등으로 부피를 측정하는 방법이 가장 정확하며, 보통의 CT로는 좌우엽의 경계가 되는 중간간정맥과 하대정맥간의 각도의 변화를 측정하는 방법으로 색전하지 않은 간엽의 비대 정도를 보는 방법이 있다. 우엽 문맥색전술 후 2주 후에 측정한 중간간정맥과 하대정맥이 이루는 각도는 좌엽의 비대로 인하여 평균 10.2도 변화를 보인다. 우엽 문맥색전술 후 좌엽 부피의 비대는 문헌상 추적 기간에 다소 차이가 있으나 33-47%로 보고(2,3,9) 되어 있으며, 이 때 간의 재생 속도는 11.2-12.4cm³/day (3,9)로 간절제술 환자에서의 재생속도와 비슷하다. 색전술을 시행하여 문맥 혈류가 차단된 우엽의 부피는 11-18%정도 위축된다(9,10).

5. 수술 시야에서 간의 변화

문맥색전술을 시행한 환자에서는 수술 시야에서 색전술을 시행한 부위의 간은 어두운 색으로 변해있어 색전술을 시행하지 않은 부위와 경계가 이루어지는 것을 볼 수 있다. 이러한 변화는 전체 환자의 58.5% 정도에서 볼 수 있으며, 간경변이 흔히 동반되는 간세포암 환자(37.5%) 보다는 간경변이 없는 간문부담도암 등의 환자(73.9%)에서 더 흔히 볼 수 있다.

A

B

Fig. 4. Right PV embolization in the patients with Klatzkin tumor.

A. Digital subtraction portal venogram shows opacified remaining left portal vein with embolization of right portal vein.

B. After right portal vein embolization with Embol-78-12, radiopaque embolized right portal veins are seen, and two microcoils(arrow) were used for embolization of tract between punctured portal vein and liver parenchyma.

합 병 증

1. 문맥 천자에 의한 합병증

문맥천자 및 색전을 위한 기구 삽입으로 인한 간실질의 손상으로 혈종 또는 복강 내 출혈이 발생할 수 있으나 임상적으로 문제가 되는 정도의 출혈은 드물다. 예방은 문맥을 천자할때 가는 주사침을 사용하는 방법과, 문맥 천자 후 피포를 문맥까지 삽입하여 시술 시 경피경간로에 필요 없는 자극을 피하는 방법을 사용한다. 또 천자할때 호흡을 참도록 하여 주사침에 의한 간 피막의 손상을 예방하여야 한다.

2. 색전물질의 역류로 인한 간기능의 저하

소량의 색전물질이 역류 되어 잔존간이 될 간엽의 문맥 분지가 막힌 경우 대부분의 환자는 이상 소견이 없으나 일부 환자에서는 수술 시 작은 부위가 검게 허탈되어있는 소견을 볼 수도 있다. 많은 양이 역류 된 경우에는 간기능이 저하되어 수술을 할 수 없게 되는 경우가 발생할 수 있다.

3. 불완전한 문맥 폐색과 문맥의 재개통

불완전한 문맥의 폐색 또는 문맥의 재개통은 간엽 비대를 효과적으로 유도할 수 없으며, 시술자의 경험 부족, 우전간분절 문맥이 좌엽 문맥에서 분지하는 정상변이, 비정상적인 혈류의 흐름, 좌우엽 간문맥이 분지하는 각도, 돼지꼬리 모양의 담배액관에 의한 문맥의 압박 등에 의하여 발생할 수 있다. 시술 2-3일 후에 색도플러로 문맥의 폐색 여부를 검사하고 문맥이 개통되어 있는 경우에는 반복 문맥색전술을 시행한다. 또 앞에서 언급한 바와 같이 양측으로 경피경간담배액술이 시행되어 있는 간문부담도암 환자에서는 담즙의 변화가 지표가 된다.

4. 경동맥화학색전술 후 문맥색전술로 인한 합병증

간세포암 환자에서 경동맥화학색전술을 시행한 직후에 문맥색전술을 시행하는 것은 간으로 들어오는 두 가지 혈류를 모두 차단 하는 행위 임으로 허혈에 의한 심한 부작용을 초래한다. 경동맥화학색전술을 시행한 후에는 간동맥 혈류가 회복되고 간기능이 정상으로 돌아오는 1개월 이상 경과 후에 문맥색전술을 시행해야 한다.

참 고 문 헌

1. Takayasu K, Muramatsu Y, Shima Y, Moriyama N, Yamada T, Makuuchi M. Hepatic lobar atrophy following obstruction of the ipsilateral portal vein from hilar cholangiocarcinoma. *Radiology* 1986;160:389-393
2. Makuuchi M, Taai BL, Takayasu K, et al. Preoperative portal embolization to increase safety of major hepatectomy for hilar bile duct carcinoma. *Surgery* 1990;107(5):521-527
3. Lee KC, Kinoshita H, Hirohashi K, Kubo S, Isawa R. Extension of surgical indication for hepatic carcinoma by portal vein embolization. *World J Surg* 1993;17:109-115
4. Nagino M, Nimura Y, Kamiya J, et al. Right and left trisegment portal vein embolization before hepatic trisegmentectomy for hilar bile duct carcinoma. *Surgery* 1995;117:677-681
5. de Baere T, Roche A, Vavasaur D, et al. Portal vein embolization: utility for inducing left hepatic lobe hypertrophy before surgery. *Radiology* 1993;188:73-77
6. 방선우, 성규보, 송호영, 조경식, 이승규, 권태원. 광범위 간절제술에서 간문맥 색전술의 역할. *대한방사선의학회지* 1995;32(5):769-774
7. 최건우, 이승규, 민병철, 성규보. 대량간절제 환자에서의 술전 간문맥 색전술의 의의. *대한외과학회지* 1995;48:69-76
8. 박상수, 이남섭, 김태영, 윤현기, 성규보, 송호영. 새로운 액상 혈관폐색물질을 이용한 간문맥색전술 : 돼지에서의 초기 실험. *대한방사선의학회지* 1997;37:861-866
9. Nagino M, Nimura Y, Kamiya J, et al. Changes in hepatic lobe volume in biliary tract cancer patients after right portal vein embolization. *Hepatology* 1995;21(2):434-439
10. de Baere T, Roche A, Elias D, Laser P, Largarange C, Bousson V. Preoperative portal vein embolization for extension of hepatectomy indications. *Hepatology* 1996;24:1386-1391

Embolization of the Renal Artery

오 주 형

경희대학교 의과대학 진단방사선과학교실

1964년 실험동물에서 카테터를 이용한 신동맥 색전술이 처음 보고된 이래(1), 치료적 혹은 수술에 대한 보조요법으로서 신동맥 색전술은 급속히 발전되어 왔으며, 종양이나 외상에 의한 출혈의 지혈, 신세포암에 의한 동통경감, 종괴의 크기감소, 수술 전 치료 등을 목적으로 널리 이용되고 있다.

성공적인 색전술을 위해서는 적절한 색전 물질의 선택과 시술자의 경험이 중요한 역할을 한다. 색전술 시행에 앞서 수술 시행 유무를 포함한 환자의 과거력과 이학적 검사 및 방사선검사 소견 등을 정확히 파악하고 있어야 하며 사전에 임상적외 충분한 토론을 통해 색전술의 장단점 및 합병증 등이 설명되어야 한다.

Renal Cell Carcinoma

신세포암에 대한 신동맥 색전술은 1969년 Lalli 등에 의해 처음 고안되었으며(2), 그후 Wallace 등은 신장에 국한된 경우나 제한된 전이를 보인 경우 신동맥 색전술 후 신 절제술을 시행하며 평균 생존기간이 연장되었다고 보고하고 있다(3). 그러나 신절제술전 색전술의 시행이 수술을 용이하게 하고 출혈 양을 감소시키는지는 이견들이 많다. 수술시 출혈양 감소가 뚜렷하지 않고 오히려 입원기간을 연장시켰다는 보고도 있으며 많은 비뇨기과 의사들이 실제 수술전 색전술의 장점에 대해서 동의 하지 않고 있다. 따라서 solitary kidney, 혹은 양측성 신세포암에서 일차적 치료목적으로 시행되거나, 수술이 어려운 경우에 종양과 연관된 문제(hematuria, fever pain, secondary polycythemia) 등을 해결하기 위한 보존적 치료를 목적으로 시행되는 경우가 대부분이다(4,5).

초기에 사용된 색전물질은 입자성물질(Gelfoam, PVA), coils 등이 주로 사용되었으나 불완전한 조직괴사와 높은 재개통율 등이 문제점으로 지적되었다. 동정맥루와 동반된 과혈관성 종양인 신세포암의 경우 균등한 혈관폐색을 이루기 위해서는 capillary embolization을 시켜야 하며 주로 proximal embolization을 일으키는 gelfoam, coils 경우 parasitic supply를 유발시킬 수 있어 부적당하다(6,7). Ellman 등이 처음 보고한 Absolute ethanol에 의한 신동맥 색전술은 말초

혈관까지 색전을 일으켜 이른바 medical nephrectomy를 시도할 수 있다(8). Ethanol은 동맥의 endothelial injury와 심한 조직괴사, 그리고 혈액과 작용하여 denatured protein debris를 형성하여 혈관폐색을 초래한다.

Ethanol은 효과적인 조직괴사를 초래할 수 있는 장점과 더불어 비용이 저렴하고, 쉽게 준비할 수 있고, 시술시간을 단축시킨다는 장점이 있다. 하지만 액체 색전물질인 ethanol을 다루는 데는 조심스런 시술이 필요하다. 대동맥 내로 유출된 ethanol이 inferior mesenteric artery로 흘러 대장괴사를 초래한 합병증이 보고되고 있다. 이런 합병증을 방지하기 위해 ethanol과 iodized oil(Lipiodol)을 3:1로 혼합하여 사용하는데 색전물질 주입은 투시 하에서 확인할 수 있을 뿐 아니라 ethanol을 종양에 골고루 퍼지게 하고 Lipiodol 자체가 색전물질로 작용할 수 있다는 장점이 있다. Occlusion balloon catheter 역시 ethanol 역류를 방지할 수 있는 기구로써 보다 시술을 용이하게 하고 시간을 단축시켜 준다. 또한 신혈류를 차단함으로써 endothelium과 ethanol과 접촉시간을 연장시켜서 보다 효과적인 조직괴사를 일으킨다(6,7).

사용되는 ethanol의 주입량은 대개 0.2cc/kg을 사용하며 0.4cc/kg을 초과하지 않도록 한다. 색전술시행전 미리 조영제를 occlusion balloon catheter에 주입하여 ethanol 주입속도와 주입량을 결정하는 방법을 사용하기도 한다.

시술방법은 main renal artery 중간부위에 occlusion balloon catheter를 위치시킨 후 balloon을 팽창시키기전 색전술에 의한 통증을 완화시킬 수 있게 약 2cc of 2% lidocaine을 주입한 후 balloon을 팽창시킨다. 다음 적절한 양의 ethanol을 0.5cc-2cc/sec 속도로 주입한 후 balloon을 2분간 유지시킨다.

2분 경과 뒤 5-10분에 걸쳐 catheter를 동맥내 위치시킨 상태에서 balloon내 압력을 제거하고 catheter를 통해 혈관내 남아있는 ethanol과 일부 응고된 혈액을 주사기로 흡입하여 없앤 뒤 마지막으로 혈관조영술을 시행하며 색전효과를 판정한다(Fig. 1).

신세포암에 대한 신동맥 색전술은 큰 종괴의 크기를 줄여 면역요법의 효과를 증대시키고 환자 자신의 면역기능향상을 유

발시킬 수 있다는 이론이 있지만 이를 뒷받침할만한 임상결과가 불충분하다. 또한 생존시간연장에 도움이 되는지의 여부도 아직 확립된 바 없다(4,5). 다만 일부에서 색전술과 면역요법의 병행치료로 생존기간이 연장된 것이 보고된바 있지만 적은 증례로 인해 이론의 여지가 많다. 따라서 현재는 신세포암으로 인한 증세를 완화시켜 전신적 상태를 호전시키는 보존적 치료 목적으로 주로 색전술이 시행되고 있다. Ethanol을 이용한 신동맥색전술의 합병증으로는 mesenteric artery embolism, spinal cord injury, skin necrosis, inferior vena cava thrombosis등이 올 수 있다.

Renal Angiomyolipoma

신혈관 근지방종은 크기가 4cm 이상이고, 다발성이며, 혈관이상을 많이 가지고 있을 때 증상을 잘 일으키며 4cm 이상일 경우 82-94%에서 증상을 일으키고 52-60%에서 자발적인 출혈을 일으킨다. 이처럼 출혈을 잘 일으키는 이유는 이 종양이 다혈관성 종괴이고 혈관 벽의 탄력섬유의 결여와 동맥류 등의 혈관이상을 많이 가지고 있기 때문이다(9-12).

색전술은 절제수술에 비해 간편하고 출혈부위까지 즉시 안

전하게 접근할 수 있으며 종양혈관만 선택적으로 폐쇄함으로써 정상 신 조직을 최대한 보존할 수 있는 장점이 있다.

색전술의 적응증은 종양의 크기가 4cm 이상이며 증상이 있거나 4cm 이하라도 지속적인 증상이 있는 경우, 또는 증상이 양측성인 경우이다. 일부에선 4cm 이상이면 증상이 없더라도 종괴의 성장이나 출혈을 예방하기 위하여 색전술을 시행할 것을 권고하고 있다.

색전물질은 신세포암경우처럼 주로 ethanol를 사용하지만 초선택적 색전술을 시행함으로 occlusion balloon catheter 사용이 용이치 않다. 따라서 안전한 색전술을 위해 ethanol과 lipiodol을 3:1 정도 혼합하여 미세카테터를 통해 주입한다 (Fig. 2).

Arteriovenous Malformation

신장에 생기는 Arteriovenous malformation(AVM)은 매우 드문 질환(<0.04%)으로 대개 임상적 문제를 일으키는 경우가 없으나 지속적인 다량의 혈뇨를 초래하는 경우 중재적 치료의 대상이 된다.

Gelfoam, coil, detachable balloon 과 같은 색전물질이

A

B

C

Fig. 1. A 63-year-old woman with stage IV renal cell carcinoma
A. Initial CT scan shows cystic mass in right kidney.
B. 2 months after angioinfarction CT scan shows extensive infarction of right kidney.
C. 18 months after angioinfarction CT scan shows marked atrophy of right kidney.

신장의 AVM 치료에 사용될 수 있으나 다른 부위의 AVM과 마찬가지로 갖은 재발이 문제점으로 지적되고 있다. Ethanol을 이용한 색전술이 AVM의 core를 색전할 수 있다는 점에서 보다 효과적일 수 있다. 이 경우 공급혈관을 초선택하여 ethanol을 0.2ml/sec 이하 속도로 천천히 주입하여야 ethanol에 의한 전신부작용을 줄일 수 있다. 또한 동정맥 단락이 심한 경우 ethanol 사용은 보다 조심스럽게 시행되어야 하며 occlusion balloon catheter를 이용해 혈류를 일시적으로 차단시키거나 coil등을 병행 사용해 전신적인 ethanol toxicity를 줄여야 한다(13,14), (Fig. 3).

Trauma

신혈관손상에 의한 출혈은 신생검, 경피적 신루설치술 등에

의해 생기는 의인성출혈이 약 50% 차지한다. 이 경우에 동정맥루를 흔히 동반하는데 70%에서는 자발적으로 폐쇄되지만 심한 혈뇨, 신기능저하 등을 초래할 수 있다. 신출혈시 색전술은 다른 장기보다 효과적일 수 있다. 이는 대개 single lobar branch에서 출혈을 일으키고, dual vascular supply가 없기 때문에 색전술의 성공률이 높다. 색전물질은 주로 Gelfoam, coil을 사용한다(15-18), (Fig. 4).

Renal Ablation

Renal ablation의 적응증은 다음과 같다.

- Irreversibly rejected renal allograft
- Urinary leak by ureteric fistulae
- Nonfunctioning hydronephrosis

Fig. 2. CT scan obtained in a 36-year-old woman with solitary angiomyolipoma in the left kidney
A. Initial CT scan shows large sized mass at lower pole of the left kidney
B. 12 months follow up CT scan after embolization reveals significantly decreased tumor volume of the left kidney.

Fig. 3. A 42-year-old woman with massive hematuria
A. Right renal arteriogram shows large, cirroid arteriovenous malformation (AVM) in lower pole.
B. Selective embolization with ethanol and coils was carried out. Postembolization arteriogram shows complete of AVM.

Fig. 4. A 46-year-old man with postbiopsy renal bleeding

A. Right common iliac arteriography after biopsy reveals extravasation of contrast media in lower pole of transplanted right kidney.
 B. Follow up arteriography after superselective coil embolization shows complete occlusion of bleeding artery.

· Hypertension of end-stage renal disease

End-stage renal failure 환자의 80%가 systemic hypertension의 증세를 갖고 있으며 antihypertensive drugs 이나 신장투석에 의해서도 호전되지 않는다. 이들은 특징적으로 신장맥내 renin치가 증가되어 있다.

최근들어 ethanol을 이용한 색전술을 통한 "medical rephrectomy"가 이런 환자의 치료에 효과적이라는 보고가 있으나 대개 신동맥 자체도 위축되고 병변을 가지기 때문에 catheterization이 매우 어려워 실제 적용에는 드문 실정이다 (19).

참 고 문 헌

1. Edling NP, Ovenfors CO. Intentional embolization in selective renal arteriography: an experimental study in dogs. *Acta Radiol Diagn* 1964;2:316-320
2. Lalli AF, Peterson N, Bookstein JJ. Roentgen-guided infarction of kidneys and lungs: A potential therapeutic technic. *Radiology* 1969;93:434-435
3. Wallace S, Shuang VP, Swanson D, et al. Embolization of renal carcinoma: Experience with 100 patients. *Radiology* 1981;138:563-570
4. Park JH, Kim SH, Han JK, et al. Transcatheter arterial embolization of unresectable renal cell carcinoma with a mixture of ethanol and iodized oil. *Cardiovasc Intervent Radiol* 1994;17:323-327
5. 오주형, 윤엽, 정유미 등. 제 4기 신세포암에서의 신동맥 색전술 및 면역요법 병행치료 효과. *대한방사선의학회지* 1994;31(1):47-53
6. Kauffmann GW, Richter GM. Renal tumors: experimental result. In: Dondelinger RFF, Rossi P, Kurdziel JC, Wallace S, eds. *Interventional radiology*. New York, NY: Thieme Medical Publishers, Inc. 1990;461:467
7. Wallace S, Charnsangavj C, Carrasco CH, et al. Renal tumors:

- clinical results. In: Dondelinger RF, Rossi P, Kurdziel JC, Wallace S, eds. *Interventional radiology*. New York, NY: Thieme Medical Publishers, Inc. 1990;468-477
8. Ellman BA, Parkhill BJ, Curry III Ts, et al. Ablation of renal tumors with absolute ethanol: A new technique. *Radiology* 1981;141:619-626
9. Lee W, Kim TS, Chung JW, et al. Renal angiomyolipoma: embolotherapy with a mixture of alcohol and iodized oil. *JVIR* 1998;9:255-261
10. 김태훈, 윤엽, 임재훈 등. 신혈관근지방종의 초선택적 색전술. *대한방사선의학회지* 1994;30(3):549-554
11. 이영환, 한영민, 김종수 등. 신혈관 근지방종: 초선택적 색전술 후 장기 추적관찰. *대한방사선의학회지* 1997;37:71-77
12. Soulen MC, Faykus MH, Shlansky-Goldberg RD, et al. Elective embolization for prevention of hemorrhage from renal angiomyolipomas. *JVIR* 1994;5:587-591
13. Taskebayashi S, Hosaka M, Ishizuka E, et al. Arteriovenous malformations of the kidneys: ablation with alcohol. *AJR* 1988;150:587-590
14. Nakamura H, Uchida H, Kuroda C, et al. Renal arteriovenous malformations: transcatheter embolization and follow-up. *AJR* 1981;137:113-116
15. Hanks SE, Katz MD. ARteriography and transcatheter embolization in the management of renal trauma. In: Baum S, Pentecost MJ, eds. *Abram's angiography*. 1st ed. Boston, MA: Little, Brown and Company 1997;892-899
16. Ueda J, Furukawa T, Takahashi S, et al. Arterial embolization control renal hemorrhage in patients with percutaneous nephrostomy. *Abdom Imaging* 1996;21:361-363
17. Bookstein JJ, Goldstein HM. Successful management of postbiopsy arteriovenous fistula with selective arterial embolization. *Radiology* 1973;109:535-536
18. 김인섭, 오주형, 윤엽. 내장가성동맥류 : 경피경관색전술. *대한방사선의학회지* 1997;36(3):417-423
19. Peregrin JH, Zabka J, Stribrana J, et al. Long-term control of hypertension and the predictive value of peripheral plasma renin activity after ablation of end stage kidneys with a new embolic agent. *Cardiovasc Intervent Radiol* 1993;16:355-360

Embolization of the Uterine Artery

안 창 수

포천중문 의과대학교 분당차병원 진단방사선과학교실

서 론

자궁근종은 35세 이상 여성에서 20% - 40%의 유병율을 보일 정도로 여성의 가장 흔한 골반내 종양이다. 자궁근종이 증상을 유발하거나 갑자기 자라서 치료를 요할 때, 40세 이후의 여성으로 더 이상의 출산이 필요 없으면 전통적으로 자궁절제술(hysterectomy)이 일차적인 치료방법으로 선택되어 왔고, 따라서 자궁절제술의 약 3분의 1이 자궁근종을 치료할 목적으로 이루어지고 있다(1). 미국의 경우 1년에 약 15만 건의 자궁절제술이 자궁근종으로 인해 이루어 질 정도이다(1). 이와 같은 자궁절제술은 여성의 생식기능을 소실 시킬 뿐 아니라 마취와 수술에 의한 여러 가지 합병증이 유발될 수 있고, 또한, 여성에게 정신적 충격을 안기기도 한다(2). 따라서 앞으로 출산을 원하는 여성에게는 생식력을 보존할 수 있는 근종절제술(surgical or laparoscopic myomectomy), 근종용해술(myoma lysis), 또는 호르몬 치료법등 보존적 치료방법을 택

하게 된다.

자궁근종은 많은 경우 여러 개의 근종이 동시에 존재하기 때문에 여러 개의 근종절제술은 수술시 출혈양이 많고, 수술시간이 길어지며, 수술 후 통증이나 합병증의 발생빈도가 높고, 자궁절제술에 비해 오히려 입원기간이 길어지는 단점이 있으며, 또한 근종절제술을 시행 받은 환자의 약 20-25%에서 근종의 재발로 인해 증상이 다시 생겨 결국 자궁절제술과 같은 수술적 치료를 요하게 되는 단점이 있다(1).

호르몬 치료법은 현저한 증상의 호전과 근종의 크기를 감소시키는 효과가 있으나, 치료를 중단할 경우 수 개월 내에 치료 이전의 크기로 다시 자라게 되어 증상이 재발하게 된다. 또한, 호르몬 치료법을 6개월이상 장기적으로 사용하게 되면, 골다공증이나 폐경기 증상과 같은 부작용이 발생하기 때문에, 주로 수술전에 근종 크기와 혈류 양을 줄여 수술 시 과다출혈 등을 예방하기 위한 한시적인 효과를 목적으로 주로 사용하게 된다(1).

1979년 분만 후 발생한 대량 출혈을 경도관 동맥 색전술로 성공적으로 치료한 문헌 보고가 있는 후(3), 세계적으로 약 49

Fig. 1. Intramural myoma, pre-embolization MRI.

An 8cm sized large intra-mural myoma was seen at posterior uterine body.

예의 분만 후 출혈을 중재적 방사선 시술로 성공적으로 치료할 수 있었고(4), 16예의 제왕절개술후의 출혈을 치료하였다. 또한 외상에 의한 골반내 출혈이나 자궁경부암에 의한 출혈, 그리고 자궁의 임신에 의한 출혈등 다양한 골반내 출혈을 경도관 동맥 색전술로써 그 치료가 최근까지 이루어져 왔고(4), 따라서 중재적 방사선과 의사에게는 비교적 친숙한 시술로 받아들여져 왔다.

그러던 중, 불란서의 산부인과 의사인 Ravina 교수가 근종 절제술이나 자궁절제술시 출혈 등의 합병증을 감소시키기 위해 중재적 방사선과 의사에게 자궁 동맥 색전술을 의뢰하였

고, 색전술을 시행 받은 일부의 환자에서 근종의 크기가 감소하고 증상이 호전되어 더 이상 수술적 치료가 필요치 않게 되어, 자궁 동맥 색전술을 자궁근종의 일차적 치료방법으로 사용하게 되었고, 그 결과를 1995년 문헌에 보고하였다(5). 그 후 자궁근종의 증상 치료방법으로 많은 자궁 동맥 색전술이 세계적으로 시행되었고, 그 결과가 보고되고 있다.

이론적 배경

모든 조직은 대사를 위한 산소와 영양공급을 위해 혈액공급

Fig. 2. Intramural myoma, pre-embolization dynamic MRI. Heterogeneous enhancement within the myoma was noted in all dynamic sequence.

Fig. 3. Intramural myoma, post-embolization MRI. T1WI sagittal image showed the myoma as high signal intensity and T2WI axial images showed dark signal intensity. The size of myoma was decreased, measuring 6.5cm in diameter.

이 필요하게 되며, 만약 혈액공급이 차단되게 되면 조직은 퇴화되고 파괴되어 단순한 화학물질로 바뀌고, 신체는 이를 흡수, 제거하게 된다. 모든 자궁근종은 자궁 근층의 혈관에 존재하는 평활근에서 기원하여 자라므로 주로 하나의 큰 혈관으로부터 주된 혈액공급을 받게 된다. 따라서 이 혈관으로부터 혈액공급을 차단하게 되면 근종은 허혈성 괴사에 이르러 점차 크기가 감소하게 된다. 그러나 근위부의 자궁동맥을 결찰하거나 coil과 같은 색전물질로 막는 방법으로 혈액공급을 차단하는 것은 난소동맥으로의 측부 경로로 인해 효과적인 색전 효과를 거둘 수 없게 된다. 또한 원위부의 자궁근종 혈관을 선택적

으로 색전하는 것은 자궁동맥 자체가 너무도 꾸불꾸불하여 선택하기도 기술적으로 불가능 하고, 많은 가지 혈관이 있어 이를 모두 선택할수 없으며, 많은 경우 원위부의 공급 동맥을 찾는 것이 힘들며, 여러 개의 자궁근종을 동시에 갖고 있는 경우가 적지 않아 이들을 모두 선택적으로 색전하기도 힘들다(6). 따라서 입자형의 색전물질을 이용하여 근위부의 자궁동맥에서 자궁동맥 자체의 혈류를 이용하여 말초부의 자궁근종을 색전 할 수밖에 없다(5). 적절한 자궁에 조영제를 주입하면 근종은 양측 자궁동맥으로부터 혈액공급을 받으며, 이는 양측 동맥의 문합에 의해 이루어 짐을 알수 있다(5, 7). 따라서 자궁

Fig. 4. Intramural myoma, post-embolization dynamic MRI.

There was no contrast enhancement into the myoma, but, normal surrounding myometrium was well enhanced in all dynamic sequence, suggesting complete coagulation necrosis of myoma after uterine artery embolization.

Fig. 5. Multiple Submucosal myomas, pre-embolization MRI.

Three submucosal myomas were seen within the endometrial cavity.

근종의 자궁 동맥 색전술은 반드시 양측 자궁동맥을 모두 시행하여야 한다(5).

적응증

과다출혈이나 종피에 의한 하복부 불편감, 또는 통증을 유발하는 자궁근종이나 최근 갑자기 자라는 자궁근종은 자궁절제술, 근종용해술, 호르몬 요법등 그 치료를 요하게 된다. 이 중 40세 이후의 출산을 필요치 않는 환자나 갑자기 자라는 근종은 주로 자궁절제술을 일차적으로 선택하게 되나, 수술에

대한 두려움으로 보존적인 치료를 원하거나, 앞으로 임신 및 출산을 원하는 환자는 자궁을 보존할수 있는 여러방법중 하나를 시행하게 된다.

자궁 동맥 색전술도 보존적 치료방법의 하나로써, 특히 근종절제술이나 근종용해술과 같은 수술적 방법을 두려워하거나 피하고자 하는 환자에게는 우선적으로 시행할 수 있으며, 그 이외에도 마취나 수술을 할 수 없는 전신 질환이 있는 경우, 이전에 여러 번의 골반내 수술로 인해 심한 유착이 의심되어 수술에 어려움이 많을 것으로 예측되는 경우, 대량 출혈로 인한 응급처치가 필요한 환자에서 다른 방법으로 치료가 되지 않

Fig. 6. Multiple Submucosal myomas, pre-embolization dynamic MRI. Heterogeneous enhancement within all three myomas was noted in all dynamic sequence.

Fig. 7. Multiple Submucosal myomas, post-embolization MRI. Previously noted two submucosal myomas were disappeared after uterine artery embolization, and residual one submucosal myoma at the uterine fundus showed high SI on T1WI and low SI on T2WI with size reduction.

는 경우에도 또한 일차적으로 시행될 수 있겠다.

그러나 자궁경부암이나 내막암등 다른 악성종양이 동반되어 있는 경우는 절대로 자궁 동맥 색전술을 시행해서는 안되며, 그 이외에도 골반내 염증이나 내막염이 있는 환자나 내막종(endometrioma), 또는 예전에 골반내 방사선치료를 시행 받은 환자도 피하는 것이 좋다.

시술 방법

시술전 자궁근종의 모든 치료방법에 대한 장, 단점을 환자에

게 충분히 설명한 후 환자가 자궁 동맥 색전술을 선택하면, 철저한 문진 및 이학적 검사를 통해 전신질환이나 과거의 골반내 수술여부등을 파악한다. 또한 Hb, Hct, FBS, WBC, platelet, PT, PTT, BT, BUN/Cr 등 혈액 화학 검사를 시행하고, EKG, Chest x-ray등을 검사한다. 또, 시술 전날부터 Gram negative, Gram positive, anaerobic bacteria에 대한 광범위 항생제를 투여한다.

자궁 동맥 색전술은 우측 대퇴동맥을 천자한 후 Seldinger's method로 6-7Fr의 vascular sheath을 삽입한 후, 먼저 5 Fr diagnostic angiocatheter로 pelvic arteriography를 시

Fig. 8. Multiple Submucosal myomas, post-embolization dynamic MRI. The remaining one submucosal myoma at the uterine fundus showed no contrast enhancement in all dynamic sequence, suggesting complete coagulation necrosis. But, normal myometrium and endometrium were well enhanced after contrast injection.

Fig. 9. Subserosal large myoma, pre-embolization MRI & dynamic study. A large 8.5cm sized subserosal myoma was noted at anterior uterine wall with multifocal secondary degeneration within the myoma on T1WI and T2WI sagittal images. The dynamic MR study showed heterogeneous enhancement within the myoma except the degenerated area.

행하여 골반내의 모든 동맥을 확인 한 후, 5 Fr angiocatheter (Yashiro, Cobra 등)로 Lt internal iliac artery를 선택한 후 contralateral anterior oblique view로 3-5cc의 contrast를 hand injection으로 먼저 촬영하면 대부분 uterine artery의 주행을 확인할 수 있으나, 만약 uterine artery의 주행을 확인할 수 없으면 ipsilateral anterior oblique view로 확인할 수 있다. Lt uterine artery의 기시부위와 그 주행을 확인 되면, roadmapping 하에 Lt Uterine artery를 3Fr microcatheter로 자궁경부동맥이 분지된 이하의 부위까지 superselection한 후, Lt uterine arteriography를 시행하여 자궁근종 및 자궁의 혈관분포 및 조영 양상을 확인하고, embolization을 시행한다. Embolization은 투시하에 조영제와 혼합된 색전물질의 흐름이 현저히 감소하거나 역류할 때 까지 시행한다. Lt uterine arterial embolization이 끝난 후 Lt internal iliac arteriography를 시행하여 embolization여부를 확인한 후 같은 방법으로 Rt uterine arterial embolization을 시행한다.

자궁동맥 색전술시 반드시 3Fr microcatheter를 사용하여야 되는가 하는 점은 시술 기관에 따라 차이가 있으나 세계적으로 가장 많은 경험을 갖고 있는 UCLA의 Goodwin은 5Fr catheter를 사용할 때에는 vascular spasm의 확률이 더욱 높아 효과적이고 확실한 색전술을 가능하게 하기 위하여 microcatheter 사용을 권장하고 있으며(8), 최근 5Fr catheter를 사용하여 약 26%의 vascular spasm이 발생했다는 보고도 있다(9).

자궁 동맥 색전술에 사용되는 색전물질로는 polyvinyl alcohol(PVA) particle과 gelfoam의 2가지가 있는데, PVA particle은 보고자에 따라 여러가지의 입자 크기를 사용하였는데, small particle (250-355um)를 사용한 보고가 large

particle(500-700um)을 사용한 보고보다 근종의 크기 감소율은 더 좋은 반면, 염증이거나 통증과 같은 합병증이 더 많이 발생하였고(5,6,8), PVA particle을 사용하고 추가로 gelfoam cube를 사용한 군과 사용하지 않은 군이 보고되고 있으나 그 결과는 큰 차이가 없다. 또, 비록 2개월의 단기 추적 결과이기도 하나, gelfoam만을 사용해도 근종의 크기 감소와 증상 치료 효과는 큰 차이가 없었다는 보고도 있다(10). 따라서 어떤 색전물질을 사용하느냐 하는 것은 좀더 많은 연구가 필요하리라 생각되나, 현재까지는 PVA particle을 주로 사용하고 있는 추세이다.

자궁 동맥 색전술후 임신이 이루어져 정상적인 자연분만을 하였다는 여러 예의 보고가 있기는 하나, 지금까지 이루어진 연구가 대부분 임신을 원하지 않는 환자를 대상으로 시행되어 왔기 때문에 색전술과 임신 및 출산에 대한 확실한 안전성은 아직까지는 입증되지 않았다고 보아야 겠다. 따라서 앞으로 이에 대한 연구가 더욱 진행되어야 임신을 원하는 여성에 대한 시술여부를 결정할 수 있을 것 같다. 그러나 만약 다른 치료방법이 없는 경우라면, 조심스럽게 시도해 볼 수는 있을 것으로 사료된다.

결 과

현재까지의 보고에 의하면 최소 85% 이상의 임상적 증상 호전을 나타냈으며, 근종의 크기도 약 39-70%의 감소를 보였다(5,6,8,11). 그러나 근종의 viability를 알 수는 없었고 단지 근종의 크기 감소와 증상의 완화만을 보고 하였으나, 최근 contrast enhanced MRI를 시행함으로써 색전술 후 근종의 viability까지도 알 수 있어 그 예후 판정에 훨씬 많은 도움을

Fig. 10. Subserosal large myoma, post-embolization MRI & dynamic study

There was focal necrotic area without contrast enhancement and viable area with contrast enhancement within the myoma on T1WI and dynamic MRI. But, the size of the myoma was decreased from 8.5cm to 5cm.

줄 수 있으리라 생각된다(12,13). 또, 색전술 전에 시행하는 MRI의 장점으로는 골반내 질환을 초음파 검사보다 더 정확히 확인할 수 있으며, 근종의 위치와 크기, 그리고 수를 더욱 정확히 알 수 있고, 산부인과 의사로 하여금 근종절제술과 색전술의 치료 결정을 하는데 도움을 주며, 다수의 근종이 있는 경우 이로 인한 내막강의 형태학적 변화를 정확히 알 수 있으며, 내막과 junctional zone의 두께를 분석할 수 있으며, 내막암의 발견이 보다 쉬워 놓칠 수 있는 확률을 줄일 수 있겠다(8). 따라서 자궁 동맥 색전술 전 및 후에 contrast enhanced MRI를 시행하는 것이 대상 환자의 선택이나 예후 판정에 많은 도움이 될 것으로 생각된다.

저자의 연구에 의하면, 색전술후 약 3개월에 시행한 31명의 MRI를 분석한 결과 41개의 intramural myoma는 모두 T1WI에서 고신호강도를, T2WI에서 저신호강도를, 그리고 dynamic MRI의 모든 시기의 강조영상에서 조영증강이 되지 않는 괴사 소견을 보였고(Fig. 1-4), 그 크기 또한 약 58%감소하였다. Submucosal myoma 13개중 4개는 아주 소실되어 관찰되지 않았으며(Fig. 5-8), 나머지 9개도 모두 괴사소견을 보였고 그 크기가 감소하였다. 13개의 subserosal myoma중 11개는 괴사 소견을 보였으나, 2개는 dynamic MRI에서 조영증강이 되어 불완전한 괴사를 나타냈다(Fig. 9,10). 이와 같이 subserosal myoma의 경우에는 collateral arterial supply가 존재할 가능성이 다른 위치의 근종보다는 상대적으로 많기 때문일 것으로 추정된다.

합 병 증

색전술을 시행한 직후부터 생리통과 유사한 심한 골반내 통증을 거의 모든 환자에서 약 6-18시간 호소하며, 시술 당일 오심과 구토를 약 2/3의 환자에서 나타낸다. 또, vaginal spotting이 있을 수 있으며, 약 20%에서 열이 날 수 있는데 이 때는 감염과의 감별이 중요하다. 따라서, 감염의 가능성을 낮추기 위하여 색전술 전날부터 1주일 후까지 예방적으로 broad spectrum antibiotics를 투여 한다.

심각한 합병증으로는 폐경과 감염이 있을 수 있는데, 그 확률은 모두 약 1%정도이고, 폐경의 원인으로는 아마도 난소동맥과의 문합을 통한 색전물질의 폐색으로 인한 난소의 기능 저하로 초래 되는 것으로 생각되며, 따라서 난소기능이 떨어져 있는 40세 이후의 여성에게 빈발하는 것으로 보고되고 있다. 감염은 보통 시술 3-4개월 내에 올 수 있으며, 대부분의 환자는 항생제의 치료로 호전되나, 만약 항생제 치료에 반응을 하지않아 염증이 계속 악화되어 pyometra나 tubo-ovarian abscess 등을 형성하게 되면, 결국 자궁절제술을 시행해야만 되는 경우도 있게 된다.

결 론

자궁 동맥 색전술은 정상적인 월경, 임신 및 출산과 같은 자궁의 기능을 보존할 수 있고, 수술을 피할 수 있으며, 짧은 입원기간 및 빠른 회복으로 조기에 일상생활에 복귀할 수 있으며, 한번의 시술로 여러 개의 자궁근종을 동시에 치료할 수 있으며, 만약 실패하더라도 다른 여러가지의 모든 치료를 다시 시행할 수 있는 장점이 있으며, 그 치료효과도 매우 좋다.

따라서, 자궁근종의 치료에는 여러가지 방법이 있으나, 자궁 동맥 색전술도 하나의 훌륭한 보존적 치료 방법이 될수 있으리라 생각된다.

참 고 문 헌

1. Wallach EE. Myomectomy In: Te Linde's operative gynecology 7th ed. Thompson JD, Rock JA (editors). Philadelphia; 1992. Pp. 647-662
2. Nathorst-Boos J, Von Schoultz B. Psychological reactions and sexual life after hysterectomy with and without oophorectomy. Fynecol Obstet Invest 1992; 3: 97-101
3. Heaston DK, Mineau DE, Brown BJ, Miller FJ. Transcatheter arterial embolization for control of persistent massive puerperal hemaffhage after bilateral surgical hypogastric artery ligation. AJR 1979; 133:152-154
4. Vedantham S, Goodwin SC, McLucas B, Mohr G. Uterine artery embolization: an underused method of controlling pelvic hemorrhage. Am J Obstet Gynecol 1997; 176 : 938-948
5. Ravina JH, Herbreteau D, Ciraru-Vigneron N, Bouret JM, Houdart E, Aymard A, Merland JJ. Arterial embolisation to treat uterine myomata. Lancet. 1995 ; 346 : 671-672
6. Worthington-Kirsch RL, Popky GL, Hutchins FL. Uterine arterial embolization for the management of leiomyomas: Quality-of-Life assessment and clinical response. Radiology 1998 ; 208 : 625-629
7. Aziz A, Petrucco OM, Makinoda S, Wikholm G, Svendsen P, Brannstrom M, Janson PO. Trasarterial embolization of the uterine arteries: patient reactions and effects on uterine vasculature. Acta Obstet Gynecol Scand 1998; 77: 334-340
8. Goodwin SC, Walker WJ. Uterine artery embolization for the treatment of uterine fibroids. Current Opinion in Obstetrics and Gynecology 1998 ; 10 : 315-320
9. Pelage JP, Dref OL, Soyer P, Jacob D, Kardache M, Dahan J, Lassau JP. Arterial anatomy of the female genital tract: variations and relevance to transcatheter embolization of the uterus. AJR 1999; 172: 989-994
10. Katz RN, Mitty HA, Cooper JM. Comparison of uterine artery embolization for fibroids using gelatin sponge pledgets and polyvinyl alcohol. J Vasc Interv Radiol 1998; 9(Suppl 1):184
11. Goodwin SC, Lee M, McLucas B, Vedantham S, Forno AE, Perrella R. Uterine artery embolization for uterine fibroids. J Vasc Interv Radiol 1998;9(Suppl 1): 184
12. Burn PR, Healy JC, Smith R, McCall JM. The magnetic resonance imaging characteristics of fibroid embolization. Radiology 1998;209(Suppl):352
13. Katsumori T, Nakajima K, Janada Y. MR imaging of a uterine myoma after embolization. AJR;172:248-249

Case 1 Osler - Weber - Rendu

Embolization of the Pulmonary Arteriovenous Fistulae in Osler-Weber-Rendu Syndrome

: Arteries therapeutic blockade, Arteriovenous fistula, Interventional Procedures, Telangiectasia
 : 57 / (A), 31 / (B)
 : A

Osler - Weber - Rendu
 B A
 가 가 Osler - Weber - Rendu

A

B

C

D

Fig. A,B. Selective pulmonary angiogram shows the pulmonary arterio-venous fistulae in the anterobasal segment of the right lower lobe(A) and in the posterobasal segment of the left lower lobe(B).
C. The postprocedural selective angiogram shows complete occlusion of the pulmonary arteriovenous fistula in the anterobasal segment of the right lower lobe.
D. The gross pathologic specimen of the excisional biopsy, posterobasalsegment of the left lower lobe, shows a lump of dark red cystic mass measuring 10 × 6 × 5 cm in dimension.

Pulmonary Arteriovenous Malformations in Osler-Weber-Rendu Syndrome

10mm, 5mm, 가
 A anterobasal segment
 postero-basal segment 70mm B
 lateral segment 13mm, lateral
 laterobasal segment 10mm
 가 . 가
 가
 5F
 A
 5mm(n=2, anterobasal segment), B
 5mm(n=2, anterobasal segment), 3mm(n=2, lateral

segment), 5mm(n=2, laterobasal segment) stainless steel coil(Gianturco,Cook Inc.,Bloomington,IN)
 . A postero-basal segment

70%가 Osler-Weber-Rendu syndrome
 Osler-Weber-Rendu syndrome
 15-35% 가 .
 , ,
 , ,
 3mm 가
 2cm , ,
 3mm 가 가

A

B

C

D

Fig. 2A-C. Superselective angiograms of the pulmonary artery shows the pulmonary arteriovenous fistulae in the laterobasal segment of the right lower lobe(A), lateral segment of the right middle lobe(B), and laterobasal segment of the left lower lobe(C). **D.** The postprocedural pulmonary angiogram shows complete disappearance of the pulmonary arteriovenous fistulae with coils.

-
1. White Jr RI, Lynch-Nyhan Alma, Terry P, Buescher PC, Farmllett EJ, Charnas L, et al. Pulmonary Arteriovenous Malformations: Techniques and Long-term Outcome of Embolotherapy. *Radiology*.1988;169:663-669
 2. Dutton, JAE, Jackson, JE, Hughes JMB, Whye MKB, Peters AM, Ussov W, et al. Pulmonary arteriovenous malformations: results of treatment with coil embolization in 53 patients. *AJR* 1995;165:1119-1125
 3. Gossage JR and Kanj G. Pulmonary Arteriovenous Malformations: A State of the Art Review. *Am J Respir Crit Care Med* 1998;158:643-661

Case 2 Rasmussen Embolization of Rasmussen Aneurysm

: Lung hemorrhage, Pseudoaneurysm pulmonary,
Pulmonary arteries therapeutic blockade,
Tuberculosis pulmonary

: 76 /

: 50cc

: Pulmonary tuberculosis with hemoptysis, abnormal bronchial arteries and pseudoaneurysm of the pulmonary artery(Rasmus-sen)

25mm 가

Fig. 1. The CT scan shows contrast filling mass in the right lower lobe during the arterial phase.

posterobasal segment

가

가

가 가

2 5F catheter
Gelfoam cube
5F catheter 5mm stainless steel coil(Gianturco, Bloomington Inc., Cook Int.)

A

B

Fig. 2. A. The selective pulmonary angiogram shows the pseudoaneurysm supplied from the posterobasal segment of the right lower inferior pulmonary artery.

B. The pseudoaneurysm is no more visible in the postprocedural angiogram.

Case 3

Coil Embolization in the Treatment of Pulmonary Arteriovenous Malformation

: Arteries, therapeutic blockade
 Arteriovenous malformations, pulmonary
 : 33 /
 : Chest discomfort mild DOE
 Recurrent episode of blood tinged sputum
 : Pulmonary arteriovenous malformation

, 8 mm coil 3 5 mm coil 2

(Fig. 5). 2 CT scan

가
 (Fig. 6).

가

. Extracardiac right - to - left shunt

가

(Fig. 1,2)

paradoxical embolization

paradoxical embolization

3

6 - F

5 - F

mm

headhunter

40 - 50 %

5 -

9 %

(Fig.

가

3,4).

가

, 1978 Taylor

coil

1

2

Fig. 1,2. Chest CT shows the aneurysmal part of the malformation as an ovoid shaped enhancing mass, connected with two enlarged vessels.

Fig. 3. Right pulmonary angiogram shows a single feeding artery and draining vein and aneurysmal dilatation of arteriovenous communication.

Fig. 5. Pulmonary angiogram after coil embolization shows complete occlusion of the malformation.

Fig. 4. Selective angiogram of the feeding artery confirms the simple angioarchitecture of the arteriovenous malformation.

Fig. 6. Chest CT scan obtained 2 months after the embolization shows decrease in size of the aneurysmal part of the malformation. CT HU of the aneurysmal part of the malformation before and after the procedure was 137 and 12, respectively.

aneurysmal
 connection 가
 가
 type
 coil detachable balloon 가
 paradoxical embolization
 direct fistula

1. White RI Jr. Pulmonary arteriovenous malformations: how do we diagnose them and why is it important to do so? *Radiology* 1992;182:633-635
2. White RI Jr, Mitchell SE, Barth KH, et al. Angioarchitecture of pulmonary arteriovenous malformations: an important consideration before embolotherapy. *AJR* 1983;140:681-686
3. Hartnell GG, Jackson JE, Allison DJ. Coil embolization of pulmonary arteriovenous malformation. *Cardiovasc Intervent Radiol* 1990;13:347-350

Case 4 Microcoil

Embolization of Multiple Pulmonary Arteriovenous Malformations with Microcoils

: Arteriovenous malformation, pulmonary
Arteries, therapeutic blockade
Pulmonary angiography

: 40 /

: 10

1 가

CT

85.9mmHg

가

(Fig. 1). 3D-CT

(SSD image)

1

가

(Fig. 2A, B).

(feeding artery)

Fig. 1. Chest PA shows well-defined round radiopaque lesions with adjacent multiple tortuous tangled vascular structures on the right mid-lung field, and a radiopaque mass-like lesion on left lower lung field.

A

B

Fig. 2. A,B. Three-dimensional CT angiography shows two nodules with dilated parent pulmonary artery and draining vein in the lateral and medial segment of right middle lobe, and a nidus in left lower lobe.

(Fig. 3A),
(Fig. 4A).
(Fig. 5A).

(Fig. 3B,
4B, 5B). 가 2 가
(Fig. 3A), 가
- MWCE - 18S - 4/2 Tornado(Cook, Bloomington, IN,
USA)

5F Multipurpose (Cook, Bloomington, IN, USA)
3F SP (Terumo Corporation, Japan)
MWCE - 18S - 6/2
Tornado(Cook, Bloomington, IN, USA) 1
MWCE - 18S - 4/2 Tornado(Cook, Bloomington, IN, USA)
1 MWCE - 18S - 6/2 Tornado(Cook, Bloomington, IN, USA) 1

가 가

A B
Fig. 3. A,B. Pulmonary arteriogram(A) shows an opacification of nidus with a dilated parent pulmonary artery and early draining vein in the lateral segment of right middle lobe. Postembolization arteriogram(B) shows complete occlusion of the parent artery by a microcoil. Note migrated microcoils in the opacified nidus(A).

A B
Fig. 4. A,B. In the medial segment of right middle lobe(A), the nidus of AVM is small, but the parent pulmonary artery is hypertrophic as the nidus on the pulmonary arteriogram. A microcoil was deployed in the parent pulmonary artery distal to a small branching artery(B).

A

B

Fig. 5. A,B. In the lateral basal segment of left lower lobe, the parent artery and nidus are opacified on the pulmonary arteriogram(A), and complete occlusion of the parent artery by a coil on the postembolization arteriogram(B).

가 .

80% 20%

1977 Porstmann

, 1980

가 ,

1. , , . 1996;34:595-598
2. Baum S. Abram's Angiography: vascular and interventional radiology. 4th ed. Boston: Little, Brown and Company, 1997:794-797
3. Savader S, Trerotola SO. Venous Interventional Radiology with Clinical Perspectives. New York: Thieme, 1996:123-134

Case 5 Embolization of Common Hepatic Artery Aneurysm

Jung-Ah Choi, MD, Sung-Bum Cho, MD, Se Hun Kim, MD, In Ho Cha, MD.

Index words :aneurysm, hepatic
aneurysm, therapy
hepatic arteries, therapeutic blockade

Case : 60-year old woman

Clinical history :The patient was admitted with abdominal pain without other prior remarkable past history, such as alcoholism, or clinical symptoms and signs.

Imaging Findings and Interventional Procedures

On contrast-enhanced abdomen CT, a round, well-circumscribed, brightly enhancing lesion was seen within another larger round lesion with low density content and rimlike calcifications (Fig. 1).

On celiac angiogram, a partially thrombosed, large aneurysm, shaped like a peanut, with a wide neck of about 2cm, originating from the common hepatic artery was seen. The aneurysm compressed the common hepatic artery partially and the left gastric artery completely (Fig. 2).

After positioning the catheter tip into the aneurysm sac and using a 5F headhunter catheter (Cook, Bloomington,

USA), one MWCE-38-8-15 coil (Cook, Bloomington, USA) was deployed into the aneurysm sac. Then three MWCE-38-5-5 coils and one 38-2-3 coil were deployed into the proximal and distal portions of the aneurysm, respectively. Postembolization celiac (Fig. 3) and superior mesenteric artery(Fig. 4) angiograms revealed barely any flow into aneurysm but intact original and accessory right hepatic arteries and patent right gastric artery, left gastric artery, and left hepatic artery.

Follow-up contrast-enhanced abdomen CT at 6 days after embolization revealed almost completely thrombosed aneurysm (Fig. 5). The patient remained in a stable condition without abdominal pain and was discharged after follow-up imaging study.

Discussion

Hepatic artery aneurysms represent about 20% of all visceral aneurysms, of which 80% are extrahepatic, and of these 63% affect the common hepatic artery. Most of them are probably due to atherosclerotic changes. Clinically, only one third of patients present with the Quinke 's classic triad of abdominal pain, hemobilia, and obstructive jaundice,

Fig. 1. Initial contrast-enhanced abdomen CT shows a round, well-circumscribed, brightly enhancing lesion within another larger round lesion with low density content and rimlike calcifications.

Fig. 2. Initial celiac angiogram demonstrates a partially thrombosed, large aneurysm, shaped like a peanut, with a wide neck of about 2cm, originating from the common hepatic artery. The aneurysm is compressing the common hepatic artery partially and the left gastric artery completely.

Fig. 3. After embolization using microcoils, the aneurysm is not visualized.

Fig. 4. Postembolization superior mesenteric artery angiogram reveals barely any flow into aneurysm but intact original and accessory right hepatic arteries and patent right gastric artery, left gastric artery, and left hepatic artery.

while the majority of patients (60-80%) present with rupture at their first clinical presentation. Therefore, it is important to recognize and treat hepatic artery aneurysms before they rupture. Suggested treatments have been transarterial embolization (TAE), direct percutaneous embolization, and surgery, of which TAE is the least

Fig. 5. Follow-up contrast-enhanced abdomen CT at 6 days after embolization reveals almost completely thrombosed aneurysm.

invasive. For successful TAE, it is important to perform occlusion either on the neck or on both sides of the neck of the aneurysm, as it was done in our case. Sometimes embolization may be complicated by infarction of nearby visceral organs, such as the liver or stomach, so it is important to confirm intact collateral supplies, which was done in our case as well.

Although common hepatic artery aneurysms consist a small percentage of all visceral artery aneurysms, they may be complicated by rupture, accompanied by lifethreatening hemorrhage, therefore, their timely treatment is important and may be successfully achieved by transarterial embolization, using metal coils as in our case.

References

1. Sakamoto I, Fujimoto T, Iwanaga S, Fukuda T, Matsunaga N, Hayashi K. Embolization and percutaneous aspiration of hepatic artery aneurysm for relief of obstructive jaundice. *JVIR* 1996; 7; 557-560
2. Abbott GT, McDermott VG, Smith TP. Successful endovascular treatment of celiac artery pseudoaneurysm complicating pancreatitis. *JVIR* 1996; 7; 103-106

Case 6

Portosystemic Shunt :

Coil

Congenital Intrahepaic Portosystemic Shunts in the Neonate: Coil Embolization Via the Umbilical Vein

: Portal vein, abnormalities
 Portal vein, therapeutic blockade
 Shunts, portosystemic
 : newborn male
 : 1 가 cyanosis lethargy
 . birth weight 3,400g
 normal spontaneous delivery . delivery
 cardiac murmur
 acidosis가 .
 : Congestive heart failure, congenital intrahepatic
 portosystemic shunts

가 ,
 . 10
 celiac trunk
 (Fig. 2). CT portohepatic venous shunt
 가 . 15 catheterization
 venous
 shunt channel 가 anomalous
 venous channel shunting
 (Fig. 3). celiac
 angiography shunt

cardiomegaly가 pulmonary
 vascularity 가 (Fig. 1). Echo - cardiography
 ductus arteriosus left to right shunt

Coil catheter 4 - F
 cobra catheter (Terumo, Tokyo, Japan)
 anomalous shunt vessel 0.035
 Terumo guide wire (Terumo, Tokyo, Japan)

Fig. 1. A chest radiography on first day of life shows severe cardiomegaly without significant increase in pulmonary vascularity.

Fig. 2. Abdominal ultrasound with color Doppler examination on the 10th day of life demonstrates anomalous venous communications between left portal branch and middle hepatic vein.

Wire catheter catheter tip
 shunt vessel 10
 3mm/2mm Tornado Embolization Microcoils (Cook,
 Bloomington, IN) deployment
 , shunt
 parenchymal perfusion (Fig. 4).
 anomalous vascular structure
 coil
 (Fig. 5).

portosystemic shunt 가 가
 가 . hepatic
 sinusoid portal vein right vitelline vein
 sinusoid
 portohepatic venous malformation
 (Fig. 6).
 Lewis
 shunt portoheaptic venous
 sepsis가 hyperbilirubinemia
 가 . shunt
 CT anomalous shunt vessel

shunt anomaly .
 portohepatic venous
 , ligation

3

4

5

Fig. 3. Portogram obtained via umbilical vein shows at least four shunts between the dilated left portal branches and the middle and left hepatic veins. The right portal vein and its branches are small compared to the left, and liver perfusion is poor.

Fig. 4. Postembolization portogram reveals a decrease in shunt flow and marked increase in parenchymal perfusion and right portal flow.

Fig. 5. Follow-up sonogram reveals metallic coils embolizing left portal branches and marked interval decrease in size of hepatic

Fig. 6. A. Schematic drawing in human embryo shows the formation of hepatic sinusoids from the right and left vitelline vein (UV=umbilical veins; RV and LV=right and left vitelline vein; S = hepatic sinusoid).

B. Persistent left vitelline vein/sinusoids (outline by diagonal lines) may explain the formation of portohepatic venous malformation seen in this patient (PV=portal vein; DV=ductus venosus).

resection, lobectomy .
portal approach
embolization
iliocolic vein portal
approach coil embolization 가 .
portohepatic venous shunt
coil embolization .
portal system
coil embolization .

1. Moore KL, Persaud TVN. The developing human. 5th ed. Philadelphia:Saunders, 1993;304-353
2. Ito K, Matsunaga N, Mitchell DG, et al. Imaging of congenital abnormalities of the portal venous system. AJR 1997;10:115-118
3. Lewis AM, Aquino NM. Congenital portohepatic vein fistula that resolved spontaneously in a neonate. AJR 1992;159:837-838

Case 7

Embolization with Microcoil and Gelfoam Pledgets in Hemobilia due to Arteriovenous Fistula

: Hemobilia, Embolization
 : 58 /
 : 3
 ,
 ,
 1
 (melena)
 : Massive Hemobilia due to Arteriovenous Fistula (Fig. 2)
 (Gelfoam sponge, Upjohn, Kalamazoo, MI) 0.1 mm ()
 (Fig. 3)
 3 - Fr
 가 (arteriovenous fistula) (Fig. 1).
 (iatrogenic cause)
 5 - Fr
 (arteriovenous fistula)
 coaxial procedure 3 - Fr microcatheter (Microferret, Cook,

Fig. 1. Selective right superior segmental hepatic arteriogram shows extravasation of contrast media via arteriovenous fistula (arrow).
Fig. 2. Three microcoils are located at the distal, fistulous tract, and proximal portion of right anterosuperior segmental hepatic artery. And contrast and hematomas fill the intrahepatic and extrahepatic bile duct.
Fig. 3. Celiac arteriogram after embolotherapy shows the successful superselective embolization (arrow).

가 가 . , 가 .

가

(dual blood supply by

hepatic artery and portal vein)

1. Cardella JF, Vujic I, Tadavarthy M, et al. Gastrointestinal bleeding. In : Castaneda-Zuniga WR, ed. Interventional Radiology. 3rd ed. Baltimore, MD: Williams & Wilkins 1997;207-252
2. Savadar SJ, Trerotola SO, Merine DS, et al. Hemobilia after percutaneous transhepatic biliary drainage : teatment with transcatheter embolotherapy. JVIR 1992;3:345-352
3. Uflaker R, Mourao GS, Piske RL, et al. Hemobilia : transcatheter occlusive therapy and long-term follow-up. Cardiovasc Intervent Radiol 1989;12:136-141

가

Case 8

가

Embolization of Arterial Pseudoaneurysm after PTBD and Stent Placement

: Aneurysm, hepatic. Bile ducts, interventional procedure.

(Fig. 3).

가 가

Arteries, therapeutic blockade

(Fig. 4).

: F/61

: PTBD 1

5 Fr Cobra catheter(Terumo, Tokyo, Japan) guide 3 Fr Microferret(COOK, Bloomington, USA) catheter 가

microcoil (Tornado 3/2 5EA,

: Tornado 5/2 1EA, MWCE - 18 - 3 - A 2EA)

(Fig. 5).

가

(Fig. 5).

duct (Fig. 1) common hepatic (10mm x 10cm) PTBD (Fig. 2). 1 26%

가 , - .

aneurysmal sac

가 . 가

1

2

3

Fig. 1. Percutaneous transhepatic cholangiogram shows luminal narrowing of CHD by tumor invasion.

Fig. 2. Hanaro stent(10cm x 1cm) is placed in right intrahepatic duct to common bile duct.

Fig. 3. Follow-up cholangiogram 1 month after shows multiple filling defects in intrahepatic duct and common bile duct due to blood clots and multiple small liver abscesses (arrowhead). Note the filling of contrast material into branch of right hepatic artery (large arrow) and multiple aneurysm like sacs(small arrow).

Case 9

가

Embolization of a Splenic Artery Pseudoaneurysm caused by Chronic Pancreatitis

: Aneurysm, splenic
Arteries, interventional
interventional procedures

microcoil 2

:29 /

:

(Fig. 3).

. ERCP ampulla of
Vater 가 .

: Splenic artery pseudoaneurysm caused by
chronic pancreatitis

8mm/5cm coil(Cook,
Bloomington, IN, USA)

. 20
CT 가 (Fig. 4).

CT 가 ,
(Fig. 1),

가 (Fig. 2).

가 가

가

가 가

5F Yashiro catheter(Cook, Bloomington, IN, USA)

0.035 Terumo

microcoil,

5mm in diameter/5cm in length(Bloomington, IN, USA) 2

가 가

Fig. 1. Contrast enhanced CT scan shows a small cystic lesion at the pancreatic body, and peripancreatic infiltration. Left pleural fluid collection is noted.

Fig. 2. Celiac arteriogram shows a small pseudoaneurysm arising at a tortuous splenic artery.

Fig. 3. Postembolization celiac arteriogram shows complete occlusion of the pseudoaneurysm.

Fig. 4. Follow up CT scan shows a metallic density at pancreatic body and focal splenic infarction

가 가 .
 (gastroepiploic arcade)
 가

1. Lipuma JP, Sachs PB, Sands MJ, Stuhlmiller S, Herbener TE. Angiography/interventional case of the day. Splenic artery pseudoaneurysm associated with pancreatitis. AJR 1997; 169: 259, 262-3.
2. , , . 가 : . 1997; 36: 417-423
3. , , , . 가 : 1 1997; 35:55-58

Case 10

가

Coil Embolization of Gastroduodenal Artery Pseudoaneurysm in a Pancreatitis Patient

: Aneurysm, abdominal · Interventional procedures

: 59 /

: 4 가

(melena)

: 가

4 CT 가

(Fig. 1).

CT 가

(Fig. 2).

1cm

가 가 가 (Fig. 3). 3.0F - coaxial catheter 가

2mm - 3mm spiral microcoil 가

가

Gelfoam 1mm³ 가
2mm - 4mm spiral microcoil

가

가

(Fig. 4A).

가

Fig. 2. Pseudocysts are disappeared. Gastroduodenal artery seems an ellipsoid and to be enlarged. The lower density material surrounds the gastroduodenal artery.

Fig. 1. Abdominal CT scan shows multiple pseudocysts. The most anterior pseudocyst abuts gastroduodenal artery and the higher density material is visible within it.

Fig. 3. Selective angiography of the gastroduodenal artery shows a pseudoaneurysm and it is measured about 1cm in diameter.

A **Fig. 4. A.** Arterial phase of the postembolic angiography shows the occlusion at the proximal gastroduodenal artery and the pseudoaneurysmal sac is not seen.
B. Retrograde filling of the contrast material to the pseudoaneurysmal sac is seen through the gastroepiploic artery on delayed phase.

CT 가
 5% - 10%
 15% - 20% 가
 가
 가
 가
 Gelfoam 가
 Coil 가
 가 Coaxial catheter 가

가 가
 가
 가
 Coil
 가
 가
 1. Frank B, Claude L, Jean-Michel B. Arterial complications of pancreatitis: Diagnostic and therapeutic aspects in 104 cases. JVIR 1993;4:551-558
 2. Tae Kyoung Kim. Embolization in abdominal visceral organs. In Man Chung Han, Jae Hyung Park. Interventional Radiology. 1st ed. Ilchokak, 1999;39-52

Case 11

(Angiodysplasia)

Embolization of G-I Bleeding Due to Angiodysplasia

: Angiodysplasia, embolization , 4.3 g/dl 11.0 g/dl
 : 61 / .
 : 2

: Angiodysplasia in jejunal artery , (or AVM,
 vascular ectasia), ,
 40

(Fig. 1).
 (early draining vein)

5F , 80%
 가 (angiodysplasia)
 3F
 (Fig. 2) 가
 N - butyl 2 - cyanoacrylate lipiodol (1:2)
 (Fig. 3) .

gelfoam microcoil

1 **Fig. 1.** During the arterial phase of a superior mesenteric arteriogram, abnormal clusters of small arteries could be identified in jejunal branch (arrow).
2 **Fig. 2.** Superselective angiogram using microcatheter showed tortuous and dilated small arteries and early draining vein (arrow). At this site N-butyl 2-cyanoacrylate embolization was done.
3 **Fig. 3.** After embolization, superior mesenteric arteriogram showed no more contrast filling in angiodysplasia in jejunum.

(mesenteric

border)

nidus가
nidus
cyanoacrylate

1. Schmidt SP. Angiographic localization of small bowel angiodysplasia with use of platinum coil, JVIR 1993 ; 4(6) : 737-739
2. Uflacker R. Transcatheter embolization for treatment of acute lower gastrointestinal bleeding. Acta Radiol 1987 ; 28(4): 425 - 430
3. Weaver GA, et al. Management of bleeding angiodysplasia of upper small intestine. J Clin Gastroenterol 1985 ; 7 : 145 - 151

Case 12

가

Embolization Therapy of Common Hepatic Artery Pseudoaneurysm in Behcet's Syndrome

: Pseudoaneurysm, Embolization
Behcet's syndrome

: 31 /

: 3 CT

Budd - chiari

: Pseudoaneurysm in common hepatic artery

Embol - 78 - 12 4cc 가

2

가 가

1.8 x 1.7cm

3F

가

5

GDC coil

(20mm x 30cm 2 , 8mm x 40cm 3) 9

coil(7mm x 7cm 5 , 6mm x 6cm 4)

(Fig. 3). 3 Budd - chiari syndrome

TIPS

가

2.5 x 2cm 가 가 (Fig.

(Fig. 4).

1). 가

4.6 mm

5.0 mm

vasa vasorum

medial

elastic fiber

7 - 29%

5F catheter

coil (8mm x 5cm 1 , 5mm x 5cm 1 ,

3mm x 4cm 2)

coil

가 2/3 ,

coil

coil

' coil in

coil '

(Fig. 2).

occlusion balloon

가

가

가

vasa vasorum

1

2

Fig. 1. Uperior mesenter and celiac artery were originated in the same trunk. About 2.5 x 2cm sized pseudoaneurysm was seen in proximal common hepatic artery.

Fig. 2. To block the distal collateral flow into aneurysm sac, coil embolization of distal common hepatic artery was done using 4 coils, and then Embol 4cc was injected into the aneurysm sac.

3

4

Fig. 3. 2 months later, follow-up angiogram showed recanalization of aneurysm sac and at this time, 5 GDC coils and 9 platinum coils were used as embolic materials.

Fig. 4. On follow-up angiogram after 3 days, no more blood flow was detected in aneurysm sac.

가 가

(PVAc)

가
가

stent - graft
embol polyvinyl acetate

1. Park JH, Han MC, Michael B. Arterial manifestation of Behcet ' s disease. AJR 1984 ; 143 : 821 - 825
2. Atadan T, Yahya M, Berkmen, et al. Thoracic involvement in Behcet s disease: pathologic, clinical, and imaging features. AJR 1995 ; 164 : 51 - 56
3. (Embol-78-12)
1999 ; 40 : 237 - 246

Case 13

Embol

Transcatheter Arterial Embolization Using Embol and Coil in Renal Cell Carcinoma

: Renal cell carcinoma, Embolization
: 46 /
: 5

가 가
가 , 가

가 .
가 .
3 가 .
가 .

가

: (T3bN0M0, stage a)

MRI

(Fig. 1).

(Fig 2). Embol
(Fig. 3),
(Fig. 4).

, Ethibloc,
ethanol - lipiodol solution polyvinyl alcohol
gelfoam,
Embol polyvinyl acetate(PVAc) 가
PVAc
vinyl acetate(VAc) vinyl alcohol(VA)

7.5F - interiliac sheath

Embol

. Embol

15

Gianturco steel coil

가 . , Lanigan

Fig. 1. Gd-enhancing MRI shows large lobulated, heterogeneously enhancing renal cell carcinoma nearly replacing right kidney. The tumor invaded into right renal vein and IVC. Therefore, IVC was compressed by the tumor(arrow).

Fig. 2. Right renal angiogram shows large hypervascular tumor staining nearly replacing the kidney except for small portion of normal renal parenchyma at the inferior pole.
Fig. 3. Transcatheter arterial Embol injection was done with a balloon occlusion catheter in the proximal renal artery.
Fig. 4. After Embol injection, Gianturco steel coil(arrow) was lodged in the proximal renal artery. Post-embolization aortogram shows complete occlusion of right renal artery.

40%가

Ultavist 370

가

. Embol

가

가

Embol

10 - 15

Embol

3

1. (Embol-78-12) 1999 ; 40 : 237-246
2. Lanigan D, Jurriaans E, Hammonds JC, Wells IP, Choa RG. The current status of embolization in renal cell carcinoma a survey of local and national practice. *Clinical Radiology* 1992 ; 46 : 176-178
3. Park JH, Kim SH, Han JK, Chung JW, Han MC. Transcatheter arterial embolization of unresectable renal cell carcinoma with a mixture of ethanol and iodized oil. *Carvasc Intervent Radiol* 1994 ; 17 : 323-327

Case 14

Embolization of Renal Arteriovenous Malformation

: Kidney, Arteriovenous malformation

Embolization

: 36 /

: 3

3

: (Renal arteriovenous malfor-
mation)

(Fig. 1). 가 , cyanoacrylates 가

5F catheter
2 3F catheter

cyanoacrylates

, cyanoacrylates가

1

3).

가 , nidus 가 . road , nidus

mapping DSA , 1) , 2) 가 nidus 가 , 3) , 4) polyvinylalcohol(PVA), cyanoacrylates, absolute ethanol

(Fig. 2).

nidus

(Fig.

1

2

3

Fig. 1. Lt. renal arteriography revealed a small focus of tortuous and dilated vascular structures (arrow). Venous aneurysm was also seen in this lesion at upper pole of light. kidney.

Fig. 2. Supraselective arteriography using microcatheter demonstrated feeding artery and nidus of malformed vessel.

Fig. 3. Follow-up study after embolization with cyanoacrylates showed a complete devascularization of the lesion. Aneurysmal sac was partially filled with embolic material.

nidus
 cyanoacrylates lipiodol
 acetic acid
 nidus , catheter
 5%
 dextrose catheter . Takebayashi
 , 30
 , gelatin sponge
 alcohol PVA 4
 alcohol 5
 10 - 80%
 ,
 ,
 ,
 ,
 , Takebayashi
 가

6.3 - 48% , PVA

1. Han MC, Park JH. Interventional Radiology. Seoul : Ilchokak, 1999 : 30-38, 60-72
2. Takebayashi S, Hosaka Y, Ishizuka E, Iwasaki A, Matsubara S. Transarterial embolization and ablation of renal arteriovenous malformation : efficacy and damages in 30 patients with long-term follow up. J Urol. 1998 ;159(3) : 696-701
3. Lette J, Tardif L, Beaudry C, Lassonde J. Large renal arteriovenous malformation : scintigraphic evaluation and therapeutic embolization. Can Assoc Radiol J 1992 ; 43(5) : 381-384

Case 15 Guglielmi Detachable Coil

Endovascular Treatment of Ruptured Renal Artery Aneurysm : Embolization with GDCs

: Renal artery, aneurysm
 Renal artery, therapeutic blockade
 : 49 /
 :
 :
 CT perinephric space
 perinephric space
 (Fig. 1).
 narrow neck 가 7mm 가
 lower pole 가 가
 (Fig. 2).
 Diagnostic catheter 7-F Cyber guiding catheter
 (Meditech, Waterstone, USA) Fas tracker - 10
 (Target, Fremont, USA)
 coaxial rotating haemostatic valve heparin
 solution continuous flushing
 Seeker lite - 10
 microguidewire (Target, Fremont, USA)
 Road mapping torque device
 tip . Embolotherapy
 aneurysmography
 angioarchitecture 8mm
 × 20cm, 3mm × 8cm, 2mm × 6cm Guglielmi Detachable
 Coils 3 가 coil
 deployment . Embolotherapy

obliteration ,
 leakage (Fig. 3 A, B).
 lower pole branch가
 CT radiopaque GDCs가
 leakage ,
 , perinephric hematoma (Fig.
 4).
 1%,
 15~20%
 5%
 endovascular treatment
 visceral
 intervention standard catheter
 stiffness distal vascular access
 가
 neurointerventional
 radiology microcatheter - microguidewire

Fig. 1. Abdominal CT shows large amount of hematoma and contrast leakage in right perinephric space(arrow).

2 **3A** **3B**
Fig. 2. Right renal angiogram shows small aneurysm arising from mid-portion of renal artery, which is ruptured and perineurysmal space is filled with contrast material. A small arterial branch arising at aneurysmal sac supply lower pole of right kidney.
Fig. 3. A,B. After embolization of renal artery aneurysm with GDCs, renal angiogram performed through guiding catheter shows no more filling of aneurysmal sac and coincidental occlusion of renal arterial branch arising from aneurysmal sac.

Fig. 4. Follow-up CT shows radiopaque GDCs in the region of right renal artery, no more contrast leakage and decreased amount of hematoma in perinephric space.

가 . 가
 perinephric space microcoil
 parent renal artery
 GDCs high flexibility softness,
 controlled detachment가 가
 , wide neck 가

system embolic material visceral
 vascular lesion 가 1997
 Guglielmi Detachable Coils 8

1. Klein GE, Szolar DH, Breinl, Raith J, Schreyer HH. Endovascular treatment of renal artery aneurysms with conventional non-detachable microcoils and Guglielmi detachable coils. *Br J Urol* 1997;79:852-860
2. Remy B, Christian S, Ali AF, et al. Superselective endovascular treatment of renal vascular lesions. *J Urol* 1995;153:14-17
3. Peter EH, Stephan HD, Cristiane ME, et al. Embolization of renal vascular lesions : Clinical experience with microcoils and Tracker catheters. *Cardiovasc Intervent Radiol* 1993;16:361-367

Case 16

Coil Embolization of a Arteriovenous Fistula Complicating Percutaneous Renal Biopsy

: Renal arteries, injury. Renal arteries, interven-
tional procedures

: 20 /

: H - S (H - S purpura)
10

가 .

: Renal AV fistula

0.018
catheter(Cook, Bloominton, IN, USA)

3F Microferret
AV fistula
(Fig. 2B). 3mm/2cm

Color doppler image

(Fig. 1).

(posterior segmental artery)
(inferior subsegmental artery)

(Fig. 2A).

Fig. 1. Color Doppler US of left kidney shows direct communication of the artery and vein.

5F Cobra (Cook, Bloominton, IN, USA)

2A

B

3

Fig. 2. A,B. Left renal arteriogram shows a A-V fistula with early venous opacification(2A). The small artery is catheterized with 3F microcatheter(2B).

Fig. 3. On the postembolization arteriogram, AV fistula and small artery are embolized with platinum microcoil.

platinum tornado microcoil(Cook, Bloomington, IN, USA)

1
가 microcoil microcoil microcatheter
(Fig. 3).

4 - 16%

가
cyanoacrylate , balloon
, cyanoacrylate
gelfoam, detachable balloon,
, gelfoam 가

1. Beaujeux R, Saussine C, Al-Fakir A. Superselective endovascular treatment of renal vascular lesions. J Urol 1995;153:14-17
2. deSouza NM, Reidy JF, Koffman CG. Arteriovenous Fistulas complicating biopsy of renal allografts: treatment of bleeding with superselective embolization. AJR 1991; 156: 507-510
3. Fisher RG, Ben-Menachem Y, Whigham C. Stab wounds of the renal artery branches : angiographic diagnosis and treatment by embolization. AJR 1989; 152:1231-1235

Case 17

Renal Arteriovenous Malformation : Ethanol Embolization

: Ethanol
 Embolization
 Renal artery

1cc 1cc, 3.5cc
 (Fig. 3B).
 (Fig. 3C).

: 42 /
 : 97.12 , 98.8
 20
 :

IVU (Fig. 1).
 (dilated

vascular cluster)
 (high-velocity turbulent flow) (Fig. 2A,B). Right
 renal angiogram early arterial phase early venous drain
 (Fig. 3A).

Fig. 1. Arteriovenous malformation (AVM) in a patient with gross hematuria. IVU demonstrates mild hydronephrosis in the right kidney, but no irregular filling defect in the renal pelvis.

4Fr black cobra catheter Terumo guide wire
 AVM nidus flow
 rate flow rate
 99.9% 1.5cc . 5 - 10 가

A Longitudinal color Doppler image of the upper pole of the right kidney shows color filling the serpentine anechoic areas seen in the gray scale image.
B. Duplex ultrasound showing turbulent flow within the lucent area.

A Subselective arteriogram of upper pole segmental artery shows large cirroid arteriovenous malformation (AVM) with tortuous channels, multiple fistulous connections, and early filling of renal vein (**A**), and absolute ethanol 1cc is injected (**B**). **C**. Second arteriogram after embolization with absolute ethanol shows obliteration of AVM.

wedge wedge wedge balloon pressure injection

cirroid aneurysmal AVM
 cirroid type congenital form
 , aneurysmal type idiopathic spontaneous origin

가

, Ivalon, polymers

(denaturing blood protein),
 (dehydrating vascular endothelial cells)
 (denuding the vascular wall)

thrombosis
 50 - 75%

0.5 - 1.0mL/kg

1. Banks B, Pfister RC, Wholey M, Ferral H. Congenital arteriovenous malformation of the kidney. *AJR* 1998;171:150-151
2. Crotty KL, Orihuela E, Warren MM. Recent advances in the diagnosis and treatment of renal arteriovenous malformations and fistulas. *J Urol* 1993;150:1355-1359
3. Takebaysshi S, Aida N, Matsui K. Arteriovenous malformation of the kidneys: diagnosis and follow-up with color doppler sonography in six patients. *AJR* 1991;157:991-995
4. Yakes WF, Haas KD, Parker SH, et al. Symptomatic vascular malformations: ethanol embolotherapy. *Radiology* 1989;170:1059-1066
5. Park JH, Jeon SC, Kang HS, et al. Transcatheter renal arterial embolization with the mixture of ethanol and iodized oil (Lipiodol). *Invest Radiol* 1986;21:577-580

Fig. 3. A. Fragmented peelings of teflon guidewire wire were packed in aneurysm sac.
B. Aneurysm sac was completely filled with fragmented peelings of guidewire. Post-embolization angiogram shows partial inflow into entrance of aneurysm sac and blood flow of interlobar arteries are preserved.
Fig. 4. A. 3 days later, follow-up angiogram shows no blood flow into aneurysm sac, which suggest complete embolization of aneurysm. The remained arteriovenous cores in upper pole kidney is enhanced by renal capsular artery.
B. After Histoacrylate was injected into renal capsular artery for embolization of arteriovenous malformation, renal capsular arteriogram shows no staining of arteriovenous malformation.

Yasiro catheter	packing	(Fig. 3A).	autologous clot, Gelform, ethanol, cyanoacrylate
guidewire peeling	packing		(1) cyanoacrylate microcatheter
thrombus	(Fig. 3B).		
3	(Fig. 4A)		detachable balloon (2)
			가
	(capsular artery)		Teflon coated guidewire
	3F microferret		guidewire peeling
catheter	histoacrylate lipiodol		가 가
1:1		(Fig.	
4B).			

(arteriovenous fistula)

가

1. Savastano S, Feltrim GP, Miotto D, et al. Renal aneurysm and arteriovenous fistula: management with transcatheter embolization. *Acta Radiol* 1990;31:73-76
2. Beanjeux R, Sanssine C, al Fakir A, et al. Superselective endo-vascular treatment of renal vascular lesion. *J Urolog* 1995; 153: 14-17

Case 19

Selective Embolization with Microcoil in Recurred Varicocele

: varicocele, embolization

: 16 /

: 6

(Valsalva's

maneuver)

2

, coaxial technique

3 - Fr microcatheter

가

(Microferret, Cook, Bloomington, IN)

(Fig. 2)

(Recurrent Varicocele, Left)

(Tornado coil, Cook,
Bloomington, IN)

(Fig. 3)

(Fig. 3)

(Fig. 1)

(internal spermatic vein),

(interveterbral

vein)

(pampinofrom plexus)

6 - Fr Juskin's catheter

4 - 25%,

1

2

3

Fig. 1. With Valsalva's maneuver, left internal spermatic venogram shows incompetent valve of internal spermatic vein (large arrows), collateral veins (arrowheads), ascending lumbar veins (small arrows), and intervertebral vein (blank arrow).

Fig. 2. Left internal spermatic veins at the anterior superior iliac spine level are dilated with 3-Fr microcatheter.

Fig. 3. Successful embolization with six Tornado microcoils is proven by left renal venogram using Valsalva's maneuver.

40 - 60%

Nutcracker syndrome(

가

2 - 3cm

)

가

가

(surgical ligation) anterior superior iliac

spine level, transinguinal level, scrotal level

가 (branchs)

5 - 15%

anterior superior

iliac spine level

Gianturco coil, spiders, compressed Ivalon plugs, spiderlon, brushes, plastics, Gelfoam

가

(dislodgement)

(migration) 가

intimal dissection, rupture, spasm

detachable balloon, sclerosing therapy

1. Qian Z, Comhaire F, Kunnen M, et al. Transcatheter embolization of the internal spermatic vein for the treatment of varicocele. In: Castaneda-Zuniga WR, ed. *Interventional Radiology*. 3rd ed. Baltimore, MD: Williams & Wilkins 1997;1414-1438
2. Demas BE, Hricak H, McClure D. Varicoceles: radiologic diagnosis and treatment. *Radiol Clin North Am* 1991;29:619-627
3. Zeitler E. Embolization of varicoceles. In: Doudelinger RF, Rossi P, Kurdzei JC, et al. Eds. *Interventional radiology*. New York, NY:Thieme Medical Publishers, Inc. 1990;529-536

Case 20

Pelvic Pain Syndrome Caused by Ovarian Varices : Treatment by Transcatheter Embolization

: Ovary, diseases
 Veins, ovarian
 Veins, therapeutic blockade
 : 73 /
 : 1

5mm, 5cm(4) 8mm, 5cm(2)
 large coil(Cook, Bloomington, U.S.A.)

가 (Fig. 2).

(Chronic pelvic pain, CPP)

5F Cobra catheter(Cook, Bloomington, U.S.A.) 6

Valsalva 10%

8 - 9mm 가

가 (Fig. 1. A,B).

(Pelvic Congestion Syndrome,PCS) 가

1A

1B

2

Fig. 1. A,B. Selective Lt. ovarian venogram shows grossly dilated pelvic veins, and reflux into the dilated Lt. ovarian vein, filling of the uterine & ovarian veins, and filling of the contralateral pelvic veins.

Fig. 2. Post-embolization appearance of Lt. ovarian vein with occlusion by multiple coils.

10mm

1가

ㄷ

Valsalva

가

‘ Nutcracker Syndrome ’

1. Paul R. Cordts, LTC, MC, et al. Pelvic congestion syndrome : Early clinical results after Transcatheter ovarian vein embolization. J Vasc Surg 1998; 28: 862-8
2. : 1 1998; 38: 819-822
3. Kennedy A., Hemingway A. Radiology of ovarian varices. Br J Hosp Med 1990; 44: 38-43

Case 21

Selective Transcatheter Arterial Embolization in the Management of Persistent Hematuria after TUR-BT

: Bladder, neoplasm
 Bladder, hemorrhage
 Arteries, therapeutic blockade
 : 63 /
 : 3

catheter
 USA)

(Fig. 2). Micro - ferret
 Gelfoam particle(Upjohn, Kalamazoo,
 USA)

(Fig. 3).

electrocauterization therapy

가

formalin

silver nitrate

staining (Fig. 1).

Microferret catheter(Cook, Bloomington, USA)

Fig. 1. Right common iliac arteriogram shows an extravasation from a branch of right inferior vesical artery.

Fig. 2. Selective angiogram demonstrates hypervascular mass from right inferior vesical artery

Fig. 3. Angiography after embolization with Gelfoam particle shows no further extravasation or hypervascularities

Gelfoam, Ivalon
가 .
가 .

1. Takeshi K, Shohichi K, Takashi M, Toyoaki U. Selective embolization of the vesical artery in the management of massive bladder hemorrhage. *Radiology* 1980; 136: 345-348.
2. Joao MP, Jose MM, Maria GC. Internal iliac artery: embolization to control hemorrhage from pelvic neoplasms. *Radiology* 1989; 172: 337-339
3. Lang EK. Transcatheter embolization of pelvic vessels for control of intractable hemorrhage. *Radiology* 1981; 140: 331-339

Case 22

Transcatheter Arterial Embolization of Abnormal Uterine Bleeding

: Uterus, hemorrhage
 Arteries, uterine
 Arteries, therapeutic blockade
 1 : 30 /
 : Sudden onset genital bleeding
 20
 90/60 mmHg, Hb
 8.6
 : Abnormal Uterine Bleeding

left uterine artery tortuosity, irregular
 hypervascularity pseudoaneurysm
 (Fig. 1).

Microferret catheter(Cook, Bjaeverskov, Denmark) left
 uterine artery 10 - 5 mm coil(Cook,
 Bloomington, USA) Gelfoam (Upjohn, Kalamazoo, USA)
 tortuosity, irregular hypervascularity

Fig. 1. Selective left uterine arteriogram shows tortuosity, irregular hypervascularity, and pseudoaneurysm(arrow) of left uterine artery.

Fig. 2. Post-embolization left internal iliac arteriogram shows no abnormal findings.

pseudoaneurysm (Fig. 2). bleeding
 2 genital bleeding

2 : 37 /
 : 3 genital bleeding lower
 abdominal pain Hb 8.6

right uterine artery
 extravasation mild tortuous
 enlargement irregular hypervascularity
 (Fig. 3). Left uterine artery mild enlargement
 extravasation hypervascularity
 (Fig. 4).

Microferret cathter(Cook, Bjaeverskov, Denmark) right
 uterine artery Gelfoam (Upjohn, Kalamazoo,
 USA)
 tortuous enlargement irregular
 hypervascularity (Fig. 5). Left

3 Right internal iliac arteriogram shows no extravasation of contrast media, but irregular hypervascularity and mild tortuous enlargement(arrow) of right uterine artery.
4 Left internal iliac arteriogram shows no extravasation of contrast media and hypervascularity, but mild enlargement of left uterine artery.
5 Post-embolization arteriogram shows no irregular hypervascularity and tortuous enlargement of right uterine artery.

uterine artery

genital bleeding

abscess, pelvic pain,

low grade fever, pelvic ischemic symptom

(postpartal),

(),

Diethylstilbesterol

1. Vedantham S, Goodwin SC, McLucas B, Mohr G. Uterine artery embolization : an underused method of controlling pelvic hemorrhage. Am J Obstet Gynecol 1997 ; 176 : 938-948.

2. 1996 ; 34(6) : 817-823.

3. Brown RL, Van Moore A, Smythe AR. Arteriographic management of uterine arteriovenous fistula. Am J Obstet Gynecol 1986;155:491-493.

gelfoam pledgets coil
(transarterial embolization)

Case 23

Transcatheter Embolization of Penile High-Flow Priapism

: Penis, angiography.
 Arteries, therapeutic blockade
 : 28 /
 : 3
 3

: Penile High-Flow Priapism

common iliac artery
 internal pudendal artery cavernosal branch
 (Fig. 1).

Microferret microcathter (Cook, Bjaeverskov, Den - mark)
 internal pudendal artery cavernosal
 branch 가
 (Fig. 2). 2

internal pudendal arteriogram
 가
 (Fig. 3).

(high flow priapism)
 가
 가
 alpha - adrenergic agent ,
 alpha - adrenergic agent
 가

가
 가
 가

Fig. 1. A. Left pudendal arteriogram shows extravasation of contrast media from cavernosal branch of left penile artery.

B. Right pudendal arteriogram shows extravasation of contrast media from cavernosal branch of right penile artery.

A

B

Fig. 2. A, B. After embolization with autologous blood clots in both internal pudendal arteries, the extravasation of contrast media is not seen.

Fig. 3. A. Follow-up right pudendal arteriogram shows extravasation of contrast media from right penile artery again.
B. No extravasation of contrast media is shown in left.
C. The extravasation of contrast media is not shown in right after embolization with blood clot.

1. Walker TG, Grant PW, Goldstein I, Karne RJ, Greenfield AJ. High-flow priapism: treatment with superselective transcatheter embolization. *Radiology* 1990; 174: 1053-1054

2. Witt MA, Goldstein I, Sanz de Tejada, Greenfield AJ, Karne RJ. Traumatic laceration of intracavernosal arteries: the pathophysiology of nonischemic, high flow, arterial priapism. *J Urol* 143; 129-132

3. Walsh RA, Drose JA, Mam RB. High flow priapism secondary to injury of the cavernosal artery. *Urology* 1998; 31: 114-115

Case 24

Percutaneous Ethanol Embolotherapy in Venous Malformation

가

: Veins, abnormalities

Alcohol or ethanol

: 17 /

:

, 가 1

가 가

: (Venous malformation)

가 , 가 4 cc

(Fig. 1).

22G

1/2

1/2

(Fig. 2).

2 cc

Fig. 1. Direct puncture venogram after venous compression with pneumatic blood pressure cuff reveals opacification of the abnormally dilated venous spaces with stagnant flow. Note outflow from the malformed veins draining into the normal venous system.

Fig. 2. Venogram obtained after embolization with 2 cc of ethanol demonstrates filling defects from thrombosis in the upper half of the venous malformation.

Fig. 3. Venogram obtained after re-embolization of the lower half of the malformation with 1.5 cc of ethanol demonstrates near-complete thrombosis of the lesion.

Case 25

Coil Embolization of Femoral Arteriovenous Fistula

: Arteriovenous fistula, Embolization

: 55 /

: 4

, 2

:

(Fig. 1),

(Fig. 2).

(Fig. 4).

5F - cobra

가

(Fig. 2).

3mm x 5cm Gianturco steel

coil

(Fig. 3).

가

(Fig. 4).

가가

가

가

(,) 가

() ,

fibered coil (Gianturco steel coil, platinum microcoil), detachable balloons, tissue adhesives

, soft guidewire

가

1

2

Fig. 1. Right femoral angiogram shows early venous contrast drainage into common femoral vein.

Fig. 2. Arteriovenous fistula (arrow) is visualized just proximal to the bifurcation of common femoral artery on femoral angiogram with compression of common femoral vein.

3

4

Fig. 3. 3mm x 5cm Gianturco steel coil(arrow) was lodged in the arterio-venous fistula with an end of coil in venous side and the other end of coil in arterial side.

Fig. 4. After coil embolization, previously noted early venous contrast drainage into common femoral vein is not seen.

가

100%

가

covered stent

가

85 ~

1. Baum S, Pentecost MJ. Abrams ' Angiography : Interventional Radiology. Boston : Little, Brown and Company, 1997 : 857-868
2. Clark RA, Gallant TE, Alexander ES. Angiographic management of traumatic arteriovenous fistulas : clinical results. Radiology 1983 ; 147 : 9-13

Case 26

Wallstent

Wall Stent Placement of the Internal Carotid Artery Stenosis

: Carotid Arteries, Grafts and Prosthesis

: 71 /

: 2 2 - 4 1 - 2 2 -
3

:

6F arterial sheath 0.035
(Terumo, Japan) 4mm x

4cm

6

5cm x 8mm Easy Wall Stent
(Boston Scientific Corporation, Natick, MA)

(Fig. 2).

가

5mm x 4cm, 6mm x 4cm

balloon catheter 6

8mm x 4cm

balloon catheter 6

(Fig.

3).

1

2

3

Fig. 1. Left common carotid artery angiogram shows about 80% stenosis of the proximal internal carotid artery and decreased distal flow.

Fig. 2. Wall stent (5cm x 8mm) is placed at the stenotic portion of the left internal carotid artery after balloon angioplasty.

Fig. 3. The final angiogram shows patent carotid artery without residual stenosis or ulcerative lesion.

가 . Carotid stenting complication Global Survey
 30 2.37% minor stroke, 1.32%
 major stroke 0.98% 가
 . Neurologic sequelae 6 - 12
 0.6% 6
 2.3%, 12 3.1%
 2.3% 7.5% 2 가
 cerebral 16% 4%
 complication 가 dissection rate
 balloon inflation time 325mg ticlopidine 250mg
 complication rate ticlopidine 3
 가 8,000 10,000IU ACT
 가 200 250
 가 atropine
 가 Wall stent Palmaz stent
 . Wall 가
 가 가
 가
 . Palmaz
 carotid and vertebral ostial lesion
 . Palmaz stent extrinsic compression
 lesion
 high lesion carotid
 bifurcation Wall stent가
 81% 100%

1. Piliro Rossi, Giorgio Belloni, Andrea Lovaria, Laura Broglia, Massimo Camerlingo. Supra-aortic arterial stenosis. In: Man Chung Han ed. *Interventional Radiology*. 1st ed. Seoul, Korea: Ilchokak; 1999:270-276
2. Jay S. Yadav, Gary S. Roubin, Sriram Iyer, Jiri vitek, Peter King, William D. Fordan, Winfield S. Fisher. Elective stenting of the extracranial carotid arteries. *Circulation* 1997; 95:376-381
3. Francesca Crawley, Andrew Clifton, Huge Markus, Martin M Brown. Delayed improvement in carotid artery diameter after carotid angioplasty. *Stroke* 1997; 28:574-579

Case 27

Takayasu's Arteritis

Stent Placement in Descending Aorta Involved by Takayasu's Arteritis

: Takayasu arteritis
 Aorta, graft and prosthesis
 Arteries, transluminal angioplasty
 : 33 /
 : 15 Takayasu's arteritis
 claudication

가 Bruit가 ,

: Takayasu's arteritis of descending aorta

Scientific, Watertown MA, USA) 8 - 10

가 (Fig. 2) 8mm, 4cm Olbert balloon (Boston Scientific, Watertown MA, USA) Palmaz P308 stent (Johnson & Johnson International Systems, Warren NJ, USA) Palmaz stent 12mm, 4cm Ultrathin Diamond balloon (Boston Scientific, Watertown MA, USA) (Fig. 3).

163/78mmHg, 76/60mmHg
 108/55mmHg, 85/69mmHg

(Fig. 4)

가 (Fig. 5).

4cm
 70%
 가

Takayasu's arteritis가

(Fig. 1).

가

8mm, 4cm Ultrathin Diamond Bal-loon (Boston

가

가

Fig. 1. Descending aorta shows long segmental luminal narrowing below the level of distal thoracic aorta. Focal tight stenosis of aorta can be seen at 2cm below the diaphragm level despite angioplasty. Dissection can be seen at stenotic segment.

Fig. 2. Aortogram did not showed arterial flow below the left common iliac artery despite the normal appearing contralateral iliac arteries and aortic bifurcation.

1

2

5mm, 20mm
 5mm, 16mm JO stent (JOMED
 international AB, Helsingborg, Sweden) stent
 12 . Stent
 (Fig. 3)
 Creatinine

85 - 92%
 2 30%
 4cm

1.4mg/dl

233/54mmHg
 207/53mmHg
 250/60mmHg, 229/60mmHg

noncompliant stenosis
 가

가

Takayasu 's arteritis
 panarteritis

compliance 가 Takayasu 's arteritis

가

mechanical distention
 가

Takayasu 's arteritis 가
 가

Graft가 가

가
 . Takayasu 's arteritis

1. Sharma S, Gupta H, Saxena A, Kothari S, Taneja K, Guleria S, Rajani M. Results of renal angioplasty in nonspecific aortoarteritis (Takayasu 's disease). JVIR 1998;9:429-435
2. Perler BA, Becker GJ. Vascular intervention a clinical approach. 1998 Thieme
3. Sharma S, Sharma S, Bahl VK, Rajani M. Stent placement of obstructing dissection after percutaneous transluminal angioplasty of aortic stenosis caused by nonspecific aortitis. Cardiovasc Intervent Radiol 1997;20:377-379

Case 29

가

Tibioperoneal Trunk Pseudoaneurysm : Treatment with Compression Therapy and Balloon Angioplasty

: Behcet 's disease

Arteries, extremities

Transluminal angioplasty

: 38 /

: 1 erythema nodosum, oral
ulcer, arthralgia가 1 가
left upper calf area 가

: Behcet 's disease, pseudoaneurysm of left
tibioperoneal trunk

5 - F pig tail catheter (Cook, Bloomington, USA) aortic
bifurcation

tibioperoneal trunk 4 ~ 5cm
가 가 가 posterior tibial
artery occlusion (Fig. 1).

probe 30 compression therapy
left common femoral artery
straight catheter (Cook, Bloomington, USA)
tibioperoneal trunk 가

Fig. 1. Selective left femoral angiogram shows pseudoaneurysm of tibioperoneal trunk and occlusion of posterior tibial artery.
Fig. 2. After compression therapy, left femoral angiogram reveals pseudoaneurysm, which is markedly decreased in size but still remained.
Fig. 3. Balloon angioplasty was performed with 2.5mm perfusion balloon catheter.
Fig. 4. Left femoral angiogram after balloon angioplasty shows complete occlusion of pseudoaneurysm and patent lumen of tibioperoneal trunk.

가
가 가 (Fig. 2). 5mm x 7mm guide
wire tibioperoneal trunk 가
peroneal artery guide wire 2.5mm
diameter x 2cm length Stack perfusion PTCA balloon
catheter (ACS, Santa clara, USA) 가
angioplasty , 6 30 balloon
thrombosis (Fig. 3).
tibiop - eroneal trunk
가 가 , tibioperoneal trunk lumen
patency (Fig. 4).

. Iatrogenic femoral pseudoaneurysm
anticoagulant therapy
(40%) 76% ~ 100%
가
가 30
coronary artery
(2.5mm) perfusion balloon distal
extremity 가 parent
artery communication site endoluminal obliteration
가
peripheral extremity가
perfusion balloon

가
mechanical compression 1991 Fellmeth
iatrogenic femoral pseudoaneurysm
compression repair

catheterization iatrogenic femoral
pseudoaneurysm Behcet
peripheral extremity pseudoaneurysm
compression therapy
가 , Behcet peripheral
extremity 가
가 .
upper calf area
tibioperoneal trunk injury 가

1. Chatterjee T, Do DD, Mahler F, Meier B. Pseudoaneurysm of femoral artery after catheterization : treatment by a mechanical compression device guided by colour Doppler ultrasound. Heart 1998;79:502-504
2. Homayon H, Charles R, LaRosa, et al. Ultrasound-guided compression of iatrogenic femoral pseudoaneurysm failure, recurrence, and long-term results. J Vasc Surg 1995;22:425-433
3. Friedemann S, Wolfram T, Raymonde B, et al. Management of 219 consecutive cases of postcatheterization pseudoaneurysm. J Am Coll Cardiol 1997;30:670-675[1]

Case 30

Percutaneous Transluminal Angioplasty for Hepatic Vein Stenosis after Liver Transplantation

: Liver, transplantation. Hepatic veins, stenosis or obstruction

: 2 /

: 1 Kasai 1

2

가

:

(Fig. 1).

가 . 8mm

(Fig. 2)

5mmHg

가

가 가

24mmHg

. 8mm

10mm

(Fig. 3).

waist가

(Fig. 4)

7mmHg

가

2

가 . 2

5F arterial sheath(Cook, Bloomington, USA)

. Terumo guide-

wire(Terumo, Tokyo, Japan)

Berenstein catheter(Cook,

Bloomington, USA)

가

가

가 가

가

가 가

가

1

2

Fig. 1. Initial hepatic venography shows severe short segmental narrowing of anastomotic site (arrow) with stagnation of venous flow into the right atrium.

Fig. 2. Angioplasty with 8mm x 4cm sized balloon. There is a waist (arrow) in the mid portion of the balloon.

3

4

Fig. 3. Angioplasty with 10mm x 4cm sized balloon. The balloon was fully inflated

Fig. 4. Postangioplasty angiography shows markedly improved hepatic vein stenosis with patent flow from the hepatic vein to the right atrium.

가 .
 가 .
 mm
 10mm
 ,
 9mm
 가
 10mm
 3
 12 - 15
 가
 .

1. Zajko AB, Sheng R, Bron K, Reyes J, Nour B, Tzakis A. Percutaneous transluminal angioplasty of venous anastomotic stenoses complicating liver transplantation: intermediate-term results. *J Vasc Interv Radiol.* 1994 ;5:121-6
2. Zajko AB, Claus D, Clapuyt P, et al. Obstruction to hepatic venous drainage after liver transplantation: treatment with balloon angioplasty. *Radiology.* 1989;170:763-5
3. Egawa H, Tanaka K, Uemoto S, et al. Relief of hepatic vein stenosis by balloon angioplasty after living-related donor liver transplantation. *Clin Transplant.* 1993;7:306-11

Case 31

가 : Portal Vein Stenosis and Splenic Arterial Aneurysm in the Liver Transplantation Patient: Treatment with Stent and Coils.

: Liver transplatation. Portal vein, stenosis or obstruction. Splenic artery, aneurysm.
 : 55 /
 :
 : stenosis of portal vein anastomosis and splenic arterial aneurysm.

10mm, 69mm Wallstent (Schneider, Switzerland)

20mmHg 23mmHg 가 16mmHg
 3mmHg (Fig. 2B). 2
 가 8 micro coil (3mm x 2cm)

가
 (Fig.1B) CT

Celiac angiography

12mm 가 (pseudoaneurysm)가
 (Fig. 1A).

가

3cm

가

28mm Hg 12mmHg 16mmHg
 (Fig. 2A).

infection, rejection, renal insufficiency, neurologic complication, hemorrhage

, 가
 bile leakage (1,2).
 3%

가 (3).

7 - Fr sheath

A

B

Fig. 1. Splenic arterial pseudoaneurysm after liver trans-plantation.

A. Celiac arteriogram shows a 12mm-sized round aneurysm at the proximal portion of splenic artery .

B. Celiac arteriogram shows complete occlusion of the proximal portion of splenic artery and pseudoaneurysm after coil embolization. Splenic perfusion is reestablished through collateral circulation.

A

B

Fig. 2. Anastomotic stenosis of main and left portal vein after liver transplantation.

A. Transhepatic portogram shows segmental stenosis of portal vein with collateral circulation through the coronary vein. Pressure gradient between main portal vein and left portal vein was 26mmHg.

B. Portogram after stent placement across the stenosis shows widely patent portal vein with relief of pressure gradient into 3mmHg.

splenomegaly, ascites, variceal bleeding,
anemia

variceal bleeding

pseudoaneurysm arteriovenous fistula가
hemobilia, hemoperitoneum, gastrointestinal bleed -
ing

pseudoaneurysm

가

1. Bowen A, Hungate RG, Kaye RD, Reyes J, Towbin RB. Imaging in liver transplantation. *Radiol Clin North Am* 34:757, 1996.
2. Orons PD, Zajko AB. Angiography and interventional procedures in liver transplantation. *Radiol Clin North Am* 33:541, 1995.
3. Godoy M, Camunez F, Echenagusia A, et al. Percutaneous treatment of benign portal vein stenosis after liver transplantation. *JVIR* 1996; 7:273-276.

Case 32

Percutaneous Transluminal Angioplasty in Hepatic Arterial Anastomotic Stenosis after Liver Transplantation

: Hepatic artery, stenosis or obstruction. Art - ery, transluminal angioplasty.

: 60 /

: living related liver transplantation

가 AST/ALT가
106/1479 가

2
AST/ALT가 71/38

:

arteriogram (Fig. 6).

6 Fr sheath 5Fr RH catheter . Dasher wire (Boston Scientific International, Paris, France)

Vivaprimo balloon catheter (Boston Scientific International, Paris, France) (Fig. 2).

(Fig. 3). 1

Celiac arteriogram

가 (Fig. 1). 2.5mm

Vivaprimo balloon catheter (Boston Scientific International, Paris, France)

(Fig. 2), 가

(Fig. 3). 1

(Fig. 4)

(Fig. 5). 1 celiac

ABO incompatibility, , arterial hypoperfusion, chronic rejection .

200 - 350ml/min 가 critical flow

, kinking

Fig. 1. Celiac arteriogram shows narrowing of the hepatic artery at the anastomotic site(arrow) with hypoperfusion of distal portion.

Fig. 2. Balloon angioplasty was performed with a 2.5mm-balloon catheter(arrow).

Fig. 3. Post balloon dilatation angiogram shows well dilated stenotic site of the hepatic artery.

Fig. 5. Post balloon dilatation angiogram shows normal blood flow through the stenotic portion without residual stenosis.

Fig. 4. 1-week follow-up arteriogram shows stenosis in the more proximal hepatic artery (arrow) than anastomotic site.

Fig. 6. 1-year follow-up celiac arteriogram shows patent blood flow through the hepatic artery without stenosis.

angulation

biliary complication

가

20%

Doppler

Chronic rejection subintimal foam cell myointimal hyperplasia, intimal sclerosis가

reanastomosis , Percutaneous transluminal angioplasty , , dissection

PTA left axillary approach가 coaxial guide wire

curved

shape balloon catheter가

1. Nigel R, Karani J, Thomas S, O'Grady J, Williams R. Stenoses of vascular anastomoses after hepatic transplantation: Treatment with balloon angioplasty. *AJR* 1991;157:167-171
2. Abbasoglu O, Levy MF, Vodapally MS et al. Hepatic artery stenosis after liver transplantation-incidence, presentation, treatment, and long term outcome. *Transplantation* 1997;63(2):250-255
3. Abad J, Hidalgo EG, Cantarero JM et al. Hepatic artery anastomotic stenosis after transplantation: Treatment with percutaneous transluminal angioplasty. *Radiology* 1989;171:661-662

Case 33 Abdominal angina :
Abdominal Angina: Treatment by PTA of a Superior Mesenteric Artery

: Arteries, transluminal angioplasty

Arteries, stenosis or obstruction

: 62 /

: , 2

: Abdominal Angina

Abdominal angina

가 가
 가 가
 가
 (Steal phenomenon).

) 2

(Fig. 1).

10mm, 4cm

(Fig. 2),

(Fig. 3),

Fig. 2. A 10mm, 4cm balloon catheter was placed and inflated at stenotic segment of SMA.

A

B

Fig. 1. A. Anteroposterior projection of aortogram shows irregular aortic plaque and infrarenal aortic occlusion. **B.** Lateral projection shows high grade stenosis of proximal superior mesenteric artery and celiac artery.

Fig. 3. Aortogram obtained after angioplasty of SMA shows successful dilatation. Poststenotic dilatation is also noted.

Abdominal angina (58), , , , ,

. 가
median arcuate ligament ,
.
(2%,
9%, 92%).
(96%), .(9%,
22%)

1. Warnock G, Gaines PA, Beard JD, Cumberland DC. Treatment of intestinal angina by percutaneous transluminal angioplasty of a superior mesenteric occlusion. Clin Radiol 1992;45:18-19
2. Golden DA, Ring EJ, McLean GK, Freiman DB. Percutaneous transluminal angioplasty in the treatment of abdominal angina. AJR 1982;139:247-249

Case 34

Isolated Dissection of the Superior Mesenteric Artery(SMA)

: Aneurysm, superior mesenteric artery An-
eurysm, dissecting Angiography

: 42 /

:

7

, 0.018 inch microcoil 3

(Fig. 4),

1

CT scan

: Isolated dissection of the superior mesenteric
artery

(Fig. 5).

가

(Fig. 1,2).

가 가

Marfan syndrome,
fibromuscular dysplasia

Marfan syndrome,

89
3).

가 (Fig.

false lumen

true

lumen

abdominal aorta

3 - F

(Microferret, Cook)

1

2

Fig. 1, 2. CT scan shows enlargement of superior mesenteric artery with a rim of high attenuation encircling a crescent-shaped area of lower attenuation (intramural hematoma) and an enhancing eccentric lumen.

3

4

Fig. 3. Superior mesenteric angiogram shows smooth narrowing along the course of the artery. The origin of the branch arteries are also narrowed. Note the saccular aneurysm at the origin of the right colic artery.

Fig. 4. Follow-up angiogram after coil embolization shows complete occlusion of the right colic artery.

Fig. 5. CT scan obtained 1 month after the procedure shows complete absorption of the intramural hematoma.

coil

가

1. Takehara Y, Takahashi M, Fukaya T, Kaneko M, Koyano K, Sakaguchi S. Computed tomography of isolated dissecting aneurysm of superior mesenteric artery. *J Comput Assist Tomogr* 1988;12:678-680
2. Corbetti F, Vigo M, Bulzacchi A, Angelini F, Burigo E, Thiene G. CT diagnosis of spontaneous dissection of the superior mesenteric artery. *J Comput Assist Tomogr* 1989;13:965-967
3. Anson J, Crowell RM. Cervicocranial arterial dissection. *Neurosurgery* 1991;29:89-96

Case 35

Deep Venous Thrombosis in Lower Limb: Catheter-directed Thrombolysis and Placement of Stent

: Veins, thrombosis
 Veins, stenosis or obstruction
 Veins, interventional procedure

: 23 /

: 3

2

1

3

: Deep venous thrombosis, left leg.

가

(COOK,Bloomington,USA)

가

(Fig. 1A, B).

6 Fr sheath

sheath

5 Fr

150.000IU

(, ,)

100ml

. 12

. 3

6.600.000IU

A

B

2

Fig. 1. A,B. Initial venogram shows long-segmental thrombosis in ilio-femoral vein and irregular narrowing in superficial femoral vein.

Fig. 2. After infusion of 6.600.000 IU of urokinase for 3 days, follow-up venogram shows complete lysis of intraluminal thrombus in iliac and femoral vein irregular, curved, short-segmental stenosis in proximal common iliac vein is still remained.

A

B

Fig. 3. A,B. After insertion of the stent, final venogram shows patent common iliac vein

(95%)

(Terumo Co.,Tokyo,Japan)

25mmHg (Fig. 2). 10mm, 5cm

Wall (Schneider, Switzerland)

8mm

3A,B).

warfarin

(Fig.

1. Semba CP, Dake MD. Iliofemoral deep venous thrombosis: aggressive therapy with catheter-directed thrombolysis. *Radiology* 1994;191:487-494
2. Nazarian GK, Bjarnason H, Dietz CA, Bernadas CA, Hunter DW. Iliofemoral venous stenoses: effectiveness of treatment with metallic endovascular stents. *Radiology* 1996;200:193-199
3. Bjarnason H, Kruse JR, Asinger DA, et al. Iliofemoral deep venous thrombosis: safety and efficacy outcome during 5 years of catheter-directed thrombolytic therapy. *JVIR* 1997;8:405-418

Case 36

Ileofemoral Venous Thrombosis and Venous Spur: Combined Treatment with Urokinase Thrombolysis, Balloon Dilatation and Vascular stent

: Iliac vein, femoral vein, thrombosis
 Urokinase
 Iliac vein, transluminal angioplasty
 Stent and prosthesis
 : 77 /
 : 4

5F pulse spray catheter(ANGIODYNAMICS, NY, USA)
 24 110
 24 100
 (Fig. 2B).
 CT 가

: Ileo femoral Venous Thrombosis and Venous Spur

5F introducing sheath 8F
 sheath 10mm
 (Fig. 3),
 10mm, 5.5 - 11.2mm Wallstent(Medi - tech, MA, USA)
 (Fig. 4).

CT 가 (Fig. 1).

(Fig. 2A).

infusion length 20cm

Fig. 1. CT scan shows that sacral osteophyte compresses left common iliac vein(arrow). Common iliac and femoral vein distal to compression site are distended with thrombus.

A
Fig. 2. A. Left iliac venogram demonstrates acute thrombus in iliac vein. There is no drainage of contrast media to IVC and several collateral veins are noted.
B. After urokinase therapy, left iliac venogram reveals that thrombus has completely resolved. But focal stenosis is still seen in the left common iliac vein.

A **B**
Fig. 3. A. Focal waist at the stenosis level is seen during balloon angioplasty.
B. After full inflation of balloon, balloon get across the left common iliac vein.

A **B**
Fig. 4. A. Wallstent(diameter 10mm, length 5.5-11.2mm) was introduced and deployed in the common iliac vein.
B. Left iliac venogram after stent insertion shows patent common iliac vein and good drainage of contrast media to IVC.

pharmacomechanical thrombolysis
 가
 가
 (1).
 가
 ,
 가
 .
 가
 .
 post - thrombotic state,
 (2).
 pulse -

spray
 venous spur가
 CT
 May - Thurner
 venous
 spur가
 가
 venous spur

1. Bjarnason H, Kruse JR, Asinger DA, et al. Iliofemoral deep venous thrombosis: safety and efficacy outcome during 5 years of catheter-directed thrombolysis. *JVIR* 1997;8: 405-418
2. Berger A, Jaffe JW, York TN. Iliac compression syndrome treated with stent placement. *J Vasc Surg* 1995;21:510-514

Case 37

Urokinase

Aspiration Thrombectomy and Thrombolysis for Lower Extremity Thromboembolism

: Urokinase, Arterial embolism, Thrombolysis

: 61 /

: 15 가

urokinase(, ,) 150

(Fig. 1).

above knee

below knee 가

(antegrade puncture)

7F arterial sheath(Cook, Bloom-
ington, USA) urokinase 20

: Thromboembolism of left superficial femoral artery

(Fig. 2).

urokinase 4

1

2

3

Fig. 1. Left femoral angiography shows abrupt cut-off of left superficial femoral artery with minimal collateral vessels.

Fig. 2. Follow up angiography shows multiple filling defects in the popliteal artery and proximal portion of peroneal artery and posterior tibial artery is visualized.

Fig. 3. Follow up angiography shows a decreased extent of multiple filling defects and more portion of peroneal artery and posterior tibial artery is visualized.

4

5

Fig. 4. Guidewire inserted along the peroneal artery.

Fig. 5. Guidewire inserted along the posterior tibial artery.

6

7

8

Fig. 6,7. Follow up angiography shows widely patent peroneal artery, posterior tibial artery, and anterior tibial artery.

Fig 8. Angiography of the foot shows a fine vascularity upto the midportion of the foot.

12

(Fig. 4,5).

urokinase 4

12

urokinase

(Fig. 3). 7F arterial sheath, 50cc , three way stopcock

10

urokinase 6

8

urokinase 10

microferret

urokinase 25

(Fig 6,7,8).

가

urokinase

가

가

. 50cc
stopcock

가 three way
가

가 가

가

가

arterial sheath

1. Gorich J, Rilinger N, Sokiranski, et al. Mechanical thrombolysis of acute occlusion of both the superficial and the deep femoral arteries using a thrombectomy device. AJR 1998 ;170:1177-80
2. MC Han, JH Park. Interventional radiology. Seoul: Ilchokak,1999:232-241
3. Guenther RW, Vorwerk D. Aspiration catheter for percutaneous thrombectomy: clinical results. Radiology 1990;175: 271-3
4. . Thrombolytic therapy and thrombectomy of arterial occlusive disease. 4 , 1997;16-24

Case 38 Aortobifemoral bypass graft
 Forgarty catheter
 Iliac stent
 Combined Thrombectomy with Fogarty Catheter and Iliac Stent Placement for Occlusion of Aortobifemoral Bypass Graft

: Arteries, stenosis or obstruction
 Arteries, transluminal angioplasty
 prosthesis
 : 56 /
 : 8 both leg claudication coldness aor-
 tofemoral bypass graft 1
 가 reversed Y-shaped Gortex
 aortofemoral bypass graft Fogarty throm-
 bectomy left leg coldness가
 : Complete obstruction of Gortex aorto-femoral
 bypass graft in left

Flushing aortogram right bypass graft patent
 left bypass graft total occlusion
 left internal iliac artery common femoral
 artery collaterals (Fig. 1).
 Left common femoral artery blind puncture
 Terumo guide wire(Terumo, Tokyo, Japan)
 angiogram abdominal aorta
 anastomotic site lumen filling defect
 가 multifocal filling defect가 (Fig. 2).

Fig. 1. Abdominal aortogram shows total occlusion in left Gortex aortofemoral bypass graft site and opacification of left internal iliac artery and left common femoral artery through rich collateral vessels.
Fig. 2. Abdominal aortogram shows filling defect at proximal anastomotic level and multifocal filling defect in distal portion.
Fig. 3. With ipsilateral approach, Nitis stent, 8mm in diameter, is introduced and deployed in the anastomotic site.

4

5

Fig. 4. Balloon dilatation is performed after stent placement.

Fig. 5. Abdominal aortogram obtained after intrastent PTA shows patent stent but luminal filling defect in distal portion is remained.

8mm, 6cm Nitix stent(, ,)
 abdominal aorta anastomotic site
 4cm balloon catheter balloon dilatation
 3, 4). angiogram stent
 luminal filling defect
 5).
 stent insertion Fogarty thrombectomy
 coldness가 ambulation 가
 left popliteal artery .

occlusion femoropopliteal bypass graft iliac
 lesion percutaneous treatment , proximal
 iliac stenosis가 long iliac occlusion
 iliofemoral or femorofemoral crossover bypass
 procedure PTA가
 bypass graft site
 Fogarty thrombectomy
 stent insertion Fogarty thrombectomy
 major operation

aortofemoral bypass가 가
 medical
 condition (5 - 19%)
 (3 - 5%) femorofemoral bypass
 graft percutaneous transluminal angioplasty, iliac stent
 가 , multi - level disease가
 long

1. Kuribayashi S. Aortoiliac occlusive disease. In Han MC, Park JH. Interventional Radiology. Seoul : Ilchokak. 1999 : 283-298
2. Lopez-Galarza LA, Ray LI, Rodriguez-Lopez J, et al. Combined percutaneous trans- luminal angioplasty, iliac stent deployment, and femorofemoral bypass for bilateral

Case 39

: Urokinase

SMA Embolism : Local Fibrinolysis with Urokinase

: Arteries, embolism. Fibrinolysis

: 73 /

: , , 2

가

:

CT

(Fig. 1).

가

(Fig. 2).

Multi - sideport catheter infusion set (infusion segment:
7cm, COOK) urokinase 10 IU

bolus injection , 2 24 IU infusion ,

12 IU 110 IU urokinase infusion

. Urokinase

가

(Figs. 3 and 4).

70 - 90%

가

. 가

CT

가

가

가

1/3

A

B

Fig. 1. Enhanced CT scan shows low attenuating emboli within the superior mesenteric artery(arrow) with decreased enhancement of small bowel wall located in left abdomen.

Fig. 2. Arteriogram of superior mesenteric artery reveals complete occlusion of proximal SMA.

Fig. 4. After infusion of 1,100,000 IU of urokinase, SMA shows complete patency with excellent distal perfusion.

Fig. 3. After infusion of 500,000 IU of urokinase, SMA shows partial patency and good distal perfusion.

가 , ,
urokinase

· , side hole 가
(pulsed - spray infusion method)
· urokinase 1
가 가

1. Gonzalo S, Antonia J, Echenagusia, et al. Superior mesenteric arterial embolism: local fibrinolytic treatment with urokinase. Radiology 1997;204:775-779
2. Carlos MB, Daniel JS. Rapid revascularization of an embolic superior mesenteric artery occlusion using pulse-spray pharmacomechanical thrombolysis with urokinase. AJR 1997;169:55-57
3. Patrice GT, Michel D, Jean A, et al. Acute mesenteric ischemia: diagnosis with contrast-enhanced CT. Radiology 1996;199:632-636

Case 40

Recanalization of the Primary Axillosubclavian Vein Thrombosis

가

: Veins, stenosis or thrombosis
 Veins, interventional procedure

: 56 /

: Back pain

2

: (primary axillosubclavian vein thrombosis, effort thrombosis, Paget-Schroetter syndrome)

(Fig. 2) 90

(Fig. 3).

10

mm balloon

(elastic recoil)

10

mm, 60 mm

niti - S stent

(Fig. 4).

basilic vein
 basilic - axillary - subclavian vein

(Fig. 1).

(costoclavicular space)
 (thoracic outlet syndrome)

(subclavius),

(scalenus anticus),

1

basilic vein 7F sheath heparin 4,000 unit
 McNamara catheter
 urokinase 600,000 unit 2
 60,000 unit over night infusion
 2,000,000 unit

가

effort thrombosis

90

basilic vein

Fig. 1. Selective venogram obtained via the right basilic vein reveals a long segment of thrombosis from the jugular-subclavian junction extending peripherally to the axillary and distal basilic vein with multiple collaterals.

Fig. 2. Venogram obtained after thrombolysis with 2,000,000 unit of urokinase reveals complete lysis of the thrombus with residual focal stenosis in the subclavian vein & still remained collaterals.

Fig. 3. Stress venogram obtained with the arm in the abducted position shows accentuation of the compression of the subclavian vein.

Fig. 4. Venogram obtained after stent placement reveals restoration of the blood flow with disappearance of the collaterals.

가
1

1. Lee DH, James DM, Gilbert EB. Venous stent placement as an adjunct to the staged, multinodal treatment of Paget-Schroetter syndrome. *JVIR* 1995;6:565-570
2. 1998;39:1083-1089
3. Machleder HI. Upper extremity venous thrombosis. In Perler BA, Becker GJ. *Vascular intervention: a clinical approach*. 1st ed. New York:Thieme, 1998:657-662

Case 41

Catheter-directed Thrombolysis and Stent Implantation in a Patient with Left Iliofemoral Deep Vein Thrombosis

: Iliac vein, stent or endoprosthesis. Deep vein thrombosis. Thrombolysis.

:64 /

:

10

가

3

. Duplex

: Deep vein thrombosis, iliac vein to popliteal vein, left.

micropuncture set (Cook, Bloomington, USA) single wall puncture technique

(Fig. 1).

5Fr Cobra catheter (Cook, Bloomington, USA)

Microferret catheter (Cook, Bloomington, USA) coaxial method urokinase 100,000 unit 100ml

1,000 unit/min

. 3

2,400,000 unit

(Fig. 2)

prone position

paravertebral venous plexus ascending lumbar vein

Fig. 1. A,B. Venogram after ante-grade puncture of the left popliteal vein reveals irregular filling defect in left popliteal and femoral veins without definite collateral flow. The contrast media surrounds the filling defect, which is compatible with acute deep vein thrombosis.

A

B

(Fig. 3).
 2mmHg 가
 가 10mm, 6.8cm
 Wallstent (Schneider, Bulach, Switzerland)
 . 10mm Olbert balloon catheter (Meadox
 Surgimed, Denmark)
 1mmHg . Wallstent
 (Fig. 4)

(Fig. 5).
 (sacral promontory)
 (arterial pulsation)
 (fibrous
 web - like venous spur가

2

3

Fig. 2. After instillation of urokinase, the flow was established and most of the intraluminal filling defect disappeared.

Fig. 3. Left common iliac venogram reveals irregular filling defect (arrow) of the left common iliac vein protruded into IVC with prominent collateral vessels along ascending lumbar vein and paravertebral venous plexus.

4A

B

5

Fig. 4. A,B. Stent placement and balloon inflation was performed at the stenotic segment.

Fig. 5. Left common iliac venogram after stent placement shows restoration of the venous flow of the left common iliac vein with resolution of collateral flow.

가
iliac compression syndrome (primary patency rate) 73% 가 2
syndrome 40~62% iliac compression 가
UK thrombolysis 3 3 heparinization
72% 3
. Iliac compression syndrome venous spur
arterial repositioning, prosthetic bridging, aortic elevation, ilioiliac crossover bypass 가 patency rate
0~70% 가
thrombolysis UK
venous spur

1. Semba CP, Dake MD. Iliofemoral deep venous thrombosis: aggressive therapy with catheter-directed thrombolysis. *Radiology* 1994; 191: 487-494
2. Mickley V, Schwagierek R, Rilinger N, et al. Left iliac venous thrombosis caused by venous spur: Treatment with thrombectomy and stent implantation. *J Vasc Surg* 1998; 28: 492-497
3. Berger A, Jaffe JW, York TN. Iliac compression syndrome treated with stent placement. *J Vasc Surg* 1995; 21:510-514

Case 42

가

Stent - graft

Stent-Graft for Right Subclavian Artery Pseudoaneurysm in Behcet's Disease

: Behcet's disease
 Subclavian artery pseudoaneurysm.
 Stent - graft.

7mm (Fig. 1).

:36 /

: 3 가 10F arterial sheath . Sheath
 5F headhunter catheter(Terumo Co, Tokyo, Japan)
 . 3 8mm
 , 6cm Passager stent - graft (Boston Scientific
 Corp, Watertown, USA)
 가 Behcet's disease cover
 disease 4 x 5cm pulsatile mass 가 (Fig. 2). Stent - graft 가
 tenderness 가 . 가

: Pseudoaneurysm involving right subclavian artery in Behcet's disease

(Fig. 3).
 2 CT stent - graft 가
 (Fig. 4). 가

가 fusiform dilatation 1 cm 2cm
 x 2.5cm 가 가 . 3.5
 1.5cm 가 neck
 가 vasa vasorum

1

2

Fig. 1. Right subclavian arteriogram reveals fusiform dilatation and 3.5 x 2.5 cm sized saccular aneurysm with wide neck just distal to right vertebral artery branching point.

Fig. 2. A 8 mm x 6 cm stent-graft(Passager) was deployed at pseudoaneurysm site of right subclavian artery.

3

4

Fig. 3. Right subclavian arteriogram obtained after deployment of stent-graft shows intact lumen of right subclavian artery without visualization of pseudoaneurysm.

Fig. 4. CT scan obtained fourteen days after stent-graft reveals total thrombosis of pseudoaneurysm and good luminal patency of right subclavian artery.

obliterative endarteritis

nutrient flow

stent - graft

(endovascular)

fragility

가

가

stent - graft

stent - graft

arteriotomy site (

femoral artery)

가

가

가

1. Vaseur MA, Hanlon S, Beregi JP, Le Tourneau T, Prat A, Warennbrough H. Endovascular treatment of abdominal aneurysmal aortitis in Behcet's disease. *J Vasc Surg* 1998; 27(5): 974-976
2. Bartlett ST, Mc Carthy III WJ, Palmer AS, Flinn WR, Bergan JJ, Yao JST. Multiple aneurysms in Behcet's disease. *Arch Surg* 1988; 123: 1004-1008
3. Tuzun H, Besirli K, Sayin A, et al. Management of aneurysms in Behcet's syndrome: An analysis of 24 patients. *Surgery* 1997; 121: 150-156

Case 43

Stent Graft Insertion for Treatment of Acute Vaginal Bleeding Due to External Iliac Artery Rupture

: Stent graft, Acute bleeding

: 62 /

: Wertheim

. 8mm x 4cm

4

가

(Fig. 3). 8mm x 4cm

(Fig.

60mmHg

150

60 pint

: 가

2

CT

recurred mass가

(Fig. 1).

(Fig. 2).

Cobra

(Cook, Blooming-

ton, USA)

(saccular aneurysm)가

Fig. 1. Contrast enhanced CT scan shows recurred soft tissue mass around left external iliac artery.

2

3

4

Fig. 2. Left external iliac angiogram shows a pseudoaneurysm and extravasation of contrast media.

Fig. 3. Left external iliac angiogram after coil embolization shows persistent contrast medium leakage

Fig. 4. Temporary balloon occlusion of left external iliac artery was done.

5 **Fig. 5.** A stent graft loaded on an 8mm balloon was inserted into the external iliac artery for hemostasis during stent-graft preparation.
6 **Fig. 6.** A stent graft was dilated with a 10mm-sized balloon.
7 **Fig. 7.** Angiography after stent graft insertion shows cessation of bleeding and maintained flow through stent-graft.

4) . 8mm Jo 가 .
 PTFE(Polytetrafluoroethylene) 6-0 . 가
 12F arterial sheath (Fig. 5)
 8mm 10mm (Fig. 6).
 (Fig. 7). disseminated
 intravascular coagulation

1. Sharma S, Bhargava B, Mahapatra M, Malhotra R. Pseudoaneurysm of the superficial femoral artery following accidental trauma: result of treatment by percutaneous stent-graft placement. *Eur Radiol.* 1999;9:422-4
2. Desgranges P, Mialhe C, Cavillon A, et al. Endovascular repair of posttraumatic thoracic pseudoaneurysm with a stent graft. *AJR* 1997;169:1743-5

Case 44

Arteriovenous Fistula between Right Common Iliac Artery and IVC after Lumbar Disc Surgery: Treatment with a Stentgraft Placement

: Fistula, arteriovenous. Arteries, stents and prostheses.

5Fr Cobra catheter
stent - graft 가

:23 /

(Fig. 3,4). stent - graft

: 7 L4 - 5 herniated
intervertebral disc hemilaminectomy
discectomy 5

fistula

(Fig.5).

: -

0.05~1.0%

5Fr Multipurpose catheter

Cobra catheter

가

가

10%

24

, 20%

fistula가 (Fig.1, 2, open arrow).

1

12Fr sheath

fistula

가

가 L4 - 5 level

10mm,

4.5cm

stainless Z - stent

,

75%가 L4 - 5 level

PTFE(polytetrafluoroethylene)

coating

stent -

.

graft

stent - graft

1

2

Fig. 1,2. Abdominal aortogram shows a arteriovenous fistula between the right common iliac artery and the inferior vena cava at the L4-5 disc level (open arrow).

3 **4** **5**
Fig. 3,4. Stent-graft placement was performed across arteriovenous fistula site.

Fig. 5. Abdominal aortogram after stent placement shows complete exclusion of arteriovenous fistula.

1. McCarter DHA, Johnstone RD, Mcinnes GC, Reid DB, Pollock JG, Reid AW. Iliac arteriovenous fistula following lumbar disc

surgery treated by percutaneous endoluminal stent grafting. British Journal of Surgery 1996; 83:796-797
 2. Fruhwirth J, Koch G, Amann W, Hauser H, Flaschka G. Vascular complications of lumbar disc surgery. Acta Neurochirurgica 1996; 138:912-916
 3. Szolar DH, Preidler KW, Steiner H, et al. Vascular complications in disk surgery: report of four cases. Neuroradiology 1996; 38:521-525

2

Fig. 2. After the cannulation between the portal and hepatic vein, the venogram shows posterior gastric veins(white arrows) and left coronary collaterals.

3

Fig. 3. Post-TIPS with embolization venogram shows no shunt and collaterals.

thrombolytic therapy

1. Ulrich B, Klaus H, Martin R, et al. Noncavernomatous portal vein thrombosis in hepatic cirrhosis: treatment with transjugular intrahepatic portosystemic shunt and local thrombolysis. *Radiology* 1995; 195: 153-157
2. Shin HW, Ryeom HK, Lee SK, et al. Transjugular intrahepatic portosystemic shunt in patients with active variceal bleeding due to portal hypertension and portal vein thrombosis. *J Korean Radiol Soc* 1997; 37: 597-603
3. Daniel R, Ganger, Jason B, et al. Transjugular intrahepatic portosystemic shunt for Budd-Chiari syndrome or portal vein thrombosis. *Am J Gastroenterol* 1999; 94: 603-608

Case 46

Deep Vein Thrombosis Caused by a Huge Uterine Myoma : Preoperative Preventive IVC Filter Placement

: Venae cavae, filters. Extremities, thrombosis. Veins, thrombosis. Veins, stenosis or obstruction.

:39 /

:

10

: Deep vein thrombosis secondary to iliac vein stenosis caused by compressive effect of uterine myoma

(Fig. 1).

MR

가

A

B

Fig. 1. Ascending venography was performed to evaluate the cause of sudden swelling of left lower extremity. **(A)** The entire deep veins from the popliteal vein to the iliac veins show extensive filling defects suggesting thrombosis. **(B)** The returning contrast media failed to fill the external and common iliac veins. Collateral channels through the superficial veins of the perineum and some tributaries of internal iliac vein are noted, but the flow is insufficient.

(Fig. 2).

가

Fig. 2. A huge uterine mass, which was proved to be intramural myoma at operation and compresses the IVC bifurcation and left common iliac vein, is well depicted on MR imaging. **(A)** The mass directly compresses IVC and distal abdominal aorta. The displaced aorta firmly compresses the common iliac vein (arrows). **(B)** The axial scan of the lower level shows thrombosed internal and external iliac veins (arrow) behind the accompanying arteries.

Fig. 3. Sequential images of the procedure **(A)** Inferior vena cavogram was performed via an introducer catheter which was introduced through right internal jugular vein. Note increased lateral dimension of the IVC by the direct compression of the mass, which is well visualized as a huge soft tissue density in the lower abdomen. We can easily identify the orifices of both renal veins by the slant radiolucency at the lateral margins of the contrast column (IVC) at L1-2 level. L3 vertebral body was used as a landmark during the procedure. **(B)** At first, the distal hook wire struts (thick arrow) was deployed. Wire nest was formed by advancing the filter wire (thin arrows) around the distal hook wire struts. After the proximal hook wire struts were deployed, a release button should be pushed to disconnect the struts from the introducing system (short arrow). **(C)** Postprocedural vena cavogram performed via the introducer catheter reveals good positioning of the filter.

가 가 (temporary IVC filter)

35mm Bird 's Nest vena cava filter (Cook, Inc.) . 12Fr

Valsalva 28mm

Bird 's Nest filter가 44mm 가

1984 Greenfield May - Thurner

,가 가 가

1. . Bird 's Nest 1999: 40; 679-684
2. Vorwerk D, Schmitz-Rode T, Schuerman K, Tacke J, Guenther RW. Use of a temporary caval filter to assist percutaneous iliocaval thrombectomy: Experimental results. JVIR 1995; 6; 737-740
3. Vesely T, Darcy M, Picus D, Hicks M. Technical problems associated with placement of the Bird 's Nest inferior vena cava filter. AJR 1992: 158; 875-880

Case 47

Complication of Catheter Knotting : Removal Methods

: Angiography

Catheter

Complication

: 55 /
: 5 100cc

sheath(Maxxim, USA)

Supply, Japan) Terumo가

15cm

introducing

5Fr GLB

(Clini - cal

(Terumo, Japan)

toquing motion

Fig. 1. Traction on the catheter will cause the knot to slip over a stiff wire.

Fig. 2. With the tip of the catheter fixed, rapid advancement of the catheter(arrow) will open the knot.

Fig. 3. To-and-fro motion on the knotted catheter will cause the knot to slip and open.

Fig. 4. Advancement of the knotted catheter(arrow) will loosen and reduce the knot when the loop is fixed by the ancillary catheter.

5

6

Fig. 5. Twisted catheter is located in the tip of sheath.

Fig. 6. Advancement of the twisted catheter with stiff guide wire causes the twist loosen and open.

loop가 sheath (Fig. 5).
가 가

toque 가
(Fig. 6). loop

loop

가 sheath

가 twist kink
(knotting) sheath
가
torque 가

1. Howard R, Allen M, Michael J, Sanford L. Reduction of catheter knots. Radiology 1980;134:243-245.
2. Chinichian A, Liebeskind A, Zingesser LH, et al. Knotting of an 8-French headhunter catheter and its successful removal. Radiology 1972;104:282.
3. Young DA, Maurer RM. Successful manipulation of a knotted intravascular catheter allowing nonsurgical removal. Radiology 1970; 94:155-156